

L. BARTOLOZZI (*), S. VANNI (**), S. WHITMAN-MASCHERINI (**)
G. BERTIN (***)

CATALOGHI DEL MUSEO ZOOLOGICO «LA SPECOLA»
DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE.
I. INSECTA COLEOPTERA: TIPI.

Riassunto — Sono elencati 423 taxa tipici di 30 famiglie di Coleoptera conservati nelle collezioni del Museo Zoologico «La Specola» dell'Università di Firenze.

Abstract — *Collections of the Zoological Museum «La Specola» of the University of Florence. I. Insecta Coleoptera: type specimens.* A list is given of the 423 typical taxa in 30 Coleoptera families conserved in the Museo Zoologico «La Specola» (Florence). This Museum contains the conspicuous collections of A. Andreini, W. Fuchs, F. Piccioli and A. Senna, as well as the material collected by the Centro di Studio per la Faunistica ed Ecologia Tropicali del C.N.R. (Florence). The families are arranged in the systematic order used in The Zoological Record, Insecta, part B: Coleoptera, Vol. 117 (1983). Listed for each taxon is: species (or subspecies or infrasubspecific category), genus (or genus and species; or genus, species and subspecies), author, year of publication, page on which it appears, kind of type, catalogue number, nation, locality, date, collector, and number of specimens. All the data from the original label have been transcribed, with additional information appearing in brackets. The designation given in the original description has been reported, regardless of the actual validity or systematic position. In type series where the holotype could not be discerned with certainty all the specimens have been labelled as syntypes, while in series where the holotype (and/or allotype) were clearly identifiable then the remaining specimens have been considered as paratypes. The Buprestidae designated as «typus» by Obenberger have been indicated generically as types, as the kind could not be established with certainty. The designation of eventual lectotypes is a task better left to specialists of each group.

Key words — Types; Insecta Coleoptera.

(*) Istituto di Zoologia dell'Università di Firenze, Via Romana 17, 50125 Firenze.

(**) Museo Zoologico «La Specola» dell'Università di Firenze.

(***) Centro di Studio per la Faunistica ed Ecologia Tropicali del C.N.R. di Firenze.

INTRODUZIONE

Nel presente catalogo sono elencati 423 taxa tipici (specie, sottospecie, categorie infrasubspecifiche) di 30 famiglie di Coleoptera conservati nelle collezioni del Museo Zoologico «La Specola» dell'Università di Firenze. In queste collezioni sono incluse le cospicue raccolte di A. Andreini, W. Fuchs, F. Piccioli e A. Senna; presso il Museo è inoltre depositato il materiale raccolto dal Centro di Studio per la Faunistica ed Ecologia Tropicali del C.N.R. di Firenze.

Nella stesura di questo catalogo è stata seguita l'impostazione del lavoro di M.E. BACCHUS (1978). Le famiglie sono disposte secondo l'ordinamento sistematico utilizzato in *The Zoological Record, Insecta, part B: Coleoptera*, Vol. 117 (1983). Per ogni taxon sono indicati: la specie (o sottospecie o categoria infrasubspecifiche), il genere (o genere e specie; o genere, specie e sottospecie), l'autore, l'anno di descrizione, la pagina in cui l'entità è descritta, la categoria di tipo, il numero di collezione, la nazione e la località di raccolta, il raccoglitore, il numero di esemplari. Tutti i dati del cartellino originale sono stati trascritti, integrandoli, ove necessario, con ulteriori indicazioni racchiuse in parentesi quadra. Per ogni tipo è stata riportata la denominazione con cui è stato descritto, indipendentemente dalla attuale validità o posizione sistematica.

Nei casi di serie tipiche in cui non è stato possibile individuare con certezza l'*holotypus*, tutti gli esemplari sono stati etichettati come *syn-typi*. Se l'*holotypus* (e/o *allotypus*) era invece chiaramente identificabile, tutti gli altri esemplari della serie tipica sono stati considerati *paratypi*.

Per quanto riguarda i tipi dei Buprestidae designati da Obenberger non ci è stato possibile stabilire la categoria tipologica degli esemplari: questi sono quindi riportati nel presente catalogo con la generica indicazione di «*typus*».

Lasciamo agli specialisti di ciascun gruppo la designazione di eventuali *lectotypi*.

RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo il Prof. B. Lanza, Direttore del Museo Zoologico «La Specola» dell'Università di Firenze ed il Prof. L. Pardi, Direttore del Centro di Studio per la Faunistica ed Ecologia Tropicali del C.N.R. di Firenze, per averci consentito l'esame delle collezioni di Coleoptera conservate presso le Istituzioni da essi dirette. Un ringraziamento par-

ticolare all'amico Dr. A. Bordoni (Museo Zoologico «La Specola»), per le preziose indicazioni sistematiche e bibliografiche relative agli Staphylinidae. Ringraziamo inoltre per la loro collaborazione: S. Bílý (Narodni Muzeum, Praha), F. Cassola (Istituto di Zoologia dell'Università di Siena), G. Castellini (Museo Zoologico «La Specola»), L. Chelazzi (Centro di Studio per l'Ecologia e la Faunistica Tropicali del C.N.R. di Firenze), G. Curletti (Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola), R. Damoiseau (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles), J. Decelle (Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren), G. Gardini (Istituto di Zoologia dell'Università di Genova), C. Girard (Museum National d'Histoire Naturelle, Paris), P. Leo (Cagliari) e S. Rocchi (Museo Zoologico «La Specola»).

Abbreviazioni:

S.B.S. = Spedizione Biologica in Somalia

S.B.Z. = Spedizione Biologica in Zaire

P.L. = Programma Litorale

(*) = Materiale di proprietà del Centro di Studio per la Faunistica ed Ecologia Tropicali del C.N.R. di Firenze, depositato presso il Museo Zoologico «La Specola».

ADEPHAGA

CARABOIDEA

PAUSSIDAE

somaliae (*Paussus*), Reichensperger, 1953: 161. Holotypus ♀ (7155), Somalia, 1924 (Stefanini e Puccioni).

CICINDELIDAE

cassolai (*Megacephala regalis* ssp.), Basilewsky, 1978: 771. Paratypi ♂ e ♀ (7283), Somalia: Afgoi, IV.1978 (A. Simonetta), 2 ex.

CARABIDAE

andreinii (*Acupalpus*), Straneo, 1943b: 98. Holotypus (7173), [Etiopia]: Eritrea, Massaua, I.1901 (A. Andreini).

andreinii (*Anillus florentinus* ssp.), Jeannel, 1937: 343. Holotypus (7174), [Italia]: Poggio Cavallo (dint. Grosseto), detriti Fiume Ombrone, XI.1923 (A. Andreini).

- andreinii (Lebia)*, Straneo, 1943b: 99. Holotypus (7175), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, 1-15.VI.1901 (A. Andreini).
- brucki (Anophthalmus)*, Piccioli, 1870: 306. Holotypus ♀ (5898), [Italia]: Tana a Termini [n. 7 T/PT] (Bagni di Lucca) (F. Piccioli). Paratypus ♀ (5899), stessi dati.
- busii (Duvalius malavoltii ssp.)*, Magrini & Vanni, 1984d: 28. Paratypus ♂ (7072), [Italia]: grotta di Lavacchio (n. 99 E/MO; Semelano, Montese, Modena; m 440 s.l.m.), 14-21.XI.1981 (C. Busi).
- damone (Reicheia)*, Holdhaus, 1924: 197. Paratypi (7176), [Italia]: Poggio Cavallo, dintorni di Grosseto, IV.1920 (A. Andreini), 2 ex.
- lanzai (Duvalius jurecki ssp.)*, Straneo, 1943a: 11. Paratypi (7177), [Italia]: Buca delle Fate di Coreglia Antelminelli [n. 141 T/LU, Lucca], 17.VII.1942 (B. Lanza), 2 ♀ ♀.
- maginianus (Duvalius jureceki ssp.)*, Magrini & Vanni, 1984b: in stampa. Allotypus ♀ (6908), [Italia]: grotta Buca dei Massi Neri n. 734 T/FI (800 m a E di Montecarelli, Barberino di Mugello, Firenze; m 430 s.l.m.), 30.XII.1983 (S. Vanni e F. Magini). Paratypi (6909), stessa località, 30.XII.1983, 3 ♀ ♀, e 7.I.1984 (S. Vanni e F. Magini), 1 ♂ e 2 ♀ ♀. Paratypi (7366), stessa località 22.VII.1984 (S. Vanni), 1 ♂ e 1 ♀. Paratypi (7367), stessa località, 27.IX.1984 (S. Vanni), 2 ♂♂ e 5 ♀ ♀.
- magrinii (Duvalius)*, Vanni & Lanza, 1983: 336. Holotypus ♂ (6873), [Italia]: grotta Buca di Nadia n. 732 T/PT (Piteccio, Pistoia; m 325 s.l.m.), 12.IX.1983 (S. Vanni e P. Magrini). Allotypus ♀ (6874), stessa località, 24.VII.1983 (S. Vanni, P. Magrini e F. Magini). Paratypi (6875), stessa località, 17.IV-22.IX.1983 (S. Vanni, S. Taiti, B. Lanza, P. Magrini, F. Magini), 14 ♂♂, 2 ♀ ♀.
- mingazzinii (Duvalius bianchii ssp.)*, Magrini & Vanni, 1984a: in stampa. Paratypus ♀ (6906), [Italia]: dintorni del Valico del Paretaio (7 km a NW di Palazzuolo sul Senio, Firenze; m 850 circa), 7.VII.1983 (A. Mingazzini). Paratypus ♂ (6906), [Italia]: dintorni del Passo Sambuta (9 km a SW di Palazzuolo sul Senio, Firenze; m 1050 circa), 30.X.1983 (A. De Giovanni).
- pennisii (Duvalius)*, Magrini & Vanni, 1984c: 9. Allotypus ♀ (7148), [Italia]: Monte Brunette (Trevi, Perugia; m 1300-1400 s.l.m.), 20.V.1980 (A. Pennisi). Paratypus ♂ (7149), stessa località, 10.VI.1981 (A. Pennisi).
- robustus (Percus dejani var.)*, Straneo, 1941: 18. Paratypus (7178), [Italia]: Prov. di Pesaro, M.te Nerone, 5.X.1910 (A. Andreini).

rufithorax (*Apotomus*), Pecchioli, 1837: 445. Holotypus (4374), [Italia]: Castiglione della Pescaia, Maremma Toscana, [Grosseto].
somalica (*Callidiola*), Basilewsky, 1968: 10. Holotypus (7180), Somalia: Gelib, Alessandra, 1937 (F. Bigi). Paratypi ♂ e ♀ (7179), stessi dati, 2 ex.

DYTISCIDAE

- africanus* (*Prodaticus*), Rocchi, 1976: 289. Holotypus ♂ (3520), Somalia: Galgala Oasis, 10.X.1973 (S.B.S.), (*). Allotypus ♀ (3521), stessi dati, (*). Paratypi (3522), Somalia: Galgala Oasis, 8.X.1973 e 12.X.1973 (S.B.S.), 2 ♀ ♀, (*).
- andreinii* (*Bidessus*), Régimbart, 1905: 206. Syntypi (7299), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, V-VI.1901 (A. Andreini), 66 ex.
- andreinii* (*Copelatus*), Régimbart, 1905: 208. Syntypi (7287, 7288), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VI.1901 (A. Andreini), 4 ex.
- bilardoii* (*Laccophilus*), Pederzani & Rocchi, 1982: 77. Holotypus (6869), Rep. Pop. Congo: Reg. Nord-Est, Impfondo, à la lumière, 7.VI.1980 (G. Onore).
- brancoi* (*Hydroporus*), Rocchi, 1981: 150. Holotypus ♂ (6719), Portogallo: Minho, Mt. 800, Serra do Soajo, 26.VI.1977 (T. Branco). Allotypus ♀ (6720), stessi dati.
- congoanus* (*Clypeodytes parvulus* ssp.), Pederzani & Rocchi, 1982: 69. Holotypus (6867), Congo Brazzaville: P.K. Rouge, IV.1979 (G. Onore).
- erythraeus* (*Herophydrus*), Régimbart, 1904: 2. Syntypi (7291, 7292), [Etiopia]: Eritrea, Asmara, 5.IV.1901 (A. Andreini), 18 ex.
- lanzai* (*Uvarus*), Pederzani & Rocchi, 1982: 76. Paratypus (6868), R. Centroafricaine: Zomea, près de Mbaiki, 29-31.XII.1980 (G. Onore).
- onorei* (*Copelatus*), Pederzani & Rocchi, 1982: 79. Holotypus (6870), Rep. Pop. Congo. Plateau Koukouja, Villaggio pigmeo presso Lague, 12.IV.1980 (G. Onore).
- pederzanii* (*Cybister*), Rocchi, 1979: 35. Holotypus ♂ (6682), Rep. Pop. Congo: Djili, III.1978 (G. Onore). Allotypus ♀ (6683), stessi dati.
- pictiventris* (*Rhantus*), Régimbart, 1905: 208. Syntypi (7289, 7290), [Etiopia]: Eritrea, Assaorta, 18.V.1902 (A. Andreini), 4 ex.
- spissicornis* (*Hydrovatus*), Régimbart, 1905: 207. Holotypus (7295), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, IV.1902, detriti al torr. Rubà-Abur e Massalé (A. Andreini).

tellinii (Hydrophorus), Régimbart, 1904: 1. Neoholotypus ♂ (Rocchi, 1975: 270) (7296), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, IX.1902 (A. Andreini). Neoallotypus ♀ (Rocchi, 1975: 270) (7297), stessi dati. Neoparatypi ♂♂ e ♀♀ (Rocchi, 1975: 270) (7298), stessi dati, 7 ex.

POLYPHAGA

HYDROPHILOIDEA

HYDROPHILIDAE

abyssinica (Hydraena), Régimbart, 1905: 223. Syntypus (7305), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, V.1901 (A. Andreini). Syntypi (7307), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, V-VI.1901 (A. Andreini), 8 ex. Syntypus (7306), [Etiopia]: Eritrea, Asmara, II.1901 (A. Andreini), 2 ex.

andreinii (Hydraena), d'Orchymont, 1934: 166. Holotypus ♂ (7301), [Italia: Toscana], Lippiano, Prov. Arezzo, IX.1917 (A. Andreini). Paratypus ♀ (7304), stessi dati. Paratypus (7303), [Italia: Toscana], Lippiano (Arezzo), IX.1907 (A. Andreini). Paratypi (7302), [Italia: Toscana], Alta Val Tiberina, IX.1932 (A. Andreini), 2 ex.

andreinii (Helochares), d'Orchymont, 1939: 321. Holotypus ♂ (7332) [Etiopia]: Eritrea, Sabarguma, 15.I.1901 (A. Andreini). Paratypi ♂♂ e ♀♀ (7333), [Etiopia]: Eritrea, Sabarguma, I.1901 (A. Andreini), 19 ex.

andreinii (Ochthebius), Régimbart, 1905: 222. Syntypi (7311, 7312), [Etiopia]: Eritrea, Asmara, II.1901 (A. Andreini), 519 ex. Syntypus (7334), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VI.1901 (A. Andreini), 11 ex.

anticus (Philhydrus), Régimbart, 1905: 214. Syntypus (7323, 7324), [Etiopia]: Eritrea, Asmara, II.1901 (A. Andreini), 5 ex. Syntypus (7325), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, V-VI.1901 (A. Andreini), 3 ex.

atratus (Ochthebius), Régimbart, 1905: 221. Syntypus (7313, 7314), [Etiopia]: Eritrea, Saganeiti, IV.1901 (A. Andreini), 8 ex.

circumductus (Philhydrus), Régimbart, 1905: 213. Syntypus (7322), [Etiopia]: Eritrea, Asmara, II.1901 (A. Andreini).

conoideus (Limnebius), Régimbart, 1905: 219. Syntypus (7318, 7319), [Etiopia]: Eritrea, Asmara, II.1901 (A. Andreini), 4 ex. Syntypus (7335), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VI.1901 (A. Andreini), 4 ex.

erythraea (Hydraena), Régimbart, 1905: 223. Syntypus (7308, 7309), [Etiopia]: Eritrea, Asmara, II.1901 (A. Andreini), 3 ex. Syntypus (7310) [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VI.1901 (A. Andreini), 4 ex.

fulvescens (*Philhydrus anticus* var.), Régimbart, 1905: 214. Syntypi (7326, 7327), [Etiopia]: Eritrea, Asmara, II.1901 (A. Andreini), 3 ex. Syntypi (7328), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VI.1901 (A. Andreini), 2 ex. *gagliardii* (*Ochthebius*), d'Orchymont, 1940: 56. Paratypus ♂ (7300), [Italia: Toscana], Poggio Cavallo (dint. Grosseto), IX.1922 (A. Andreini). *kalabariensis* (*Berosus*), d'Orchymont, 1936: 115. Paratypi ♂ e ♀ (7321), [Botswana]: Tsotsoroga Pan, 17.VI-9.VII.1930 (V.-L. Kal. Exp.). *perforatus* (*Hydrochus*), Régimbart, 1905: 220. Syntypi (7315, 7316), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, V-VI.1901 (A. Andreini), 29 ex. Syntypi (7317), [Etiopia]: Eritrea, Asmara, II.1901 (A. Andreini), 14 ex. *reductus* (*Philhydrus*), Régimbart, 1905: 215. Syntypi (7329, 7330), [Etiopia]: Eritrea, Sabarguma, 25.I.1901 (A. Andreini), 2 ex. Syntypus (7331), [Etiopia]: Eritrea, Cheren, III.1903 (A. Andreini). *rigua* (*Hydraena*), d'Orchymont, 1931: 64. Paratypus ♀ (7320), [Marocco]: Tigrigra, 1885.

HISTEROIDEA

HISTERIDAE

andreinii (*Tribalus*), Müller, 1938: 170. Syntypus (7145), [Etiopia]: Eritrea, Adi Caié, VII.1902 (A. Andreini). Syntypus (7144), [Etiopia]: Eritrea, Saganeiti, IV.1901 (A. Andreini). *erythraeus* (*Paromalus*), Müller, 1938: 169. Holotypus (7146), [Etiopia]: Eritrea, Adi Caié, sotto la scorza di un tronco semi-secco, 20.IV.1902 (A. Andreini). Paratypi (7147), stessi dati, 5 ex.

STAPHYLINOIDEA

SCYDMAENIDAE

bordonii (*Euconnus*), Castellini, 1985: in stampa. Holotypus ♂ (6103), [Etiopia]: Eritrea, Adi Calé, 9-13.IV.1902 (A. Andreini). Paratypi ♂ ♂ e ♀ ♀ (6104), stessi dati, 7 ex. *lagoena* (*Scydmaenus pseudotschadensis* ssp.), Castellini, 1985: in stampa. Holotypus ♂ (6096), [Etiopia]: Eritrea, Agordà, XI.1901 (A. Andreini). *lanzai* (*Scydmaenus*), Castellini, 1983: 188. Holotypus ♂ (6099), Somalia: Sar Uanle, 12.V.1973 (S.B.S.-P.L.), (*).

- pardii (Scydmaenus)*, Castellini, 1983: 187. Holotypus ♂ (6101), Somalia: Sar Uanle, 16.VI.1973 (S.B.S.-P.L.), (*). Paratypi (6102), Somalia: Sar Uanle, 27.V-16.VI.1973 (S.B.S.-P.L.), 4 ex, (*).
- pragensis (Euconnus)*, Machulka, 1923: 70. Paratypus (6114), [Cecoslovacchia]: Kostolany (V. Machulka).
- slovenicum (Cephennium)*, Machulka, 1931: 59. Paratypus (7284), [Cecoslovacchia]: Slov., Kosice (V. Machulka).

SCAPHIDIIDAE

- erythreum (Scaphosoma)*, Pic, 1933: 119. Holotypus (7167), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VII.1901 (A. Andreini).
- notatipenne (Antongilium)*, Pic, 1933: 120. Holotypus (7168), [Etiopia]: Eritrea, Adi Caié, 9-13.IV.1902 (A. Andreini).

STAPHYLINIDAE

- andreinii (Cylindropsis)*, Bordoni, 1969: 124. Holotypus ♂ (7276) [Italia: Toscana], Moscona (Grosseto), XII.1908 (A. Andreini). Paratypi ♂ ♂ e ♀ ♀, (7280), stessi dati, XII.1908 (A. Andreini), 5 ex.; (7282), XII.1923 (A. Andreini), 3 ex.; (7281), IV.1935 (A. Andreini), 4 ex.
- andreinii (Glyptomerus) [= Lathrobium]*, Schatzmayr & Koch, 1934: 261. Holotypus ♂, (456), [Italia: Toscana], Alpi Apuane, Vergemoli, VI.1928 (A. Andreini). Paratypi (456), [Italia: Toscana]: Alpi Apuane, Fornovolasco, VI.1921 (A. Andreini), 1 ♀ e VI.1928 (A. Andreini), 1 ♀.
- andreinii (Mesotyphlus, subgen. Dexiotyphlus)*, Pace, 1979: 100. Holotypus ♂ (7270), [Italia: Toscana], Pergine (prov. di Arezzo), I.1923 (A. Andreini). Allotypus ♀ (7271), stessi dati.
- andreinii (Scotonomus)*, Binaghi, 1970: 131. Paratypi ♂ e ♀ (7266), [Italia]: Basilicata, Lagonegro, IX.1909 (A. Andreini).
- arianum (Achenium)*, Bordoni, 1980: 63. Holotypus ♂ (7269), Afghanistan occ.: Farah, 25.V.1977 (gruppo Borzatti).
- arretinum (Glyptomerus) [= Lathrobium]*, Bordoni, 1972: 361. Holotypus ♂ (451) [Italia: Toscana], M.te Favalto (Lippiano), 25.VI.1921 (A. Andreini). Paratypus ♀ (453) [Italia: Toscana], Lippiano, 8.XI.1939 (A. Andreini). Paratypi (5584), [Italia: Toscana], M.te Fa-

- valto, Lippiano, 25.VI.1921 (A. Andreini), 3 ex. Paratypi ♀ ♀ (5585), [Italia: Toscana], Lippiano, 14.V.1924 (A. Andreini), 4 ex. Paratypi ♀ ♀ (5586), [Italia: Toscana], Lippiano, XI.1925 (A. Andreini), 2 ex. Paratypi (5587), [Italia: Toscana], Marzana, Lippiano, VII.1927 (A. Andreini), 2 ex. Paratypi ♂ e ♀ (452), [Italia: Toscana], Sintiglano (Arezzo), 10.VII.1921 (A. Andreini), 2 ex. Paratypi ♀ ♀ (5572), [Italia: Toscana], Lippiano (Arezzo), 25.XI.1927 e V.1934 (A. Andreini), 2 ex. [Synon. di *L. etruscum* Piccioli, 1870: A. Bordoni, *in litteris*].
- bordonii* (*Mesotyphlus*, subgen. *Acanthotyphlus*), Pace, 1979: 102 Holotypus ♂ (7273), [Italia: Toscana], Giuncarico (dint. di Grosseto), V.1908 (A. Andreini). Allotypus ♀ (7274), stessi dati. Paratypus (7275), stessi dati.
- caligicola* (*Stenus*, subgen. *Parastenus*), Puthz, 1970: 55. Paratypus ♂ (7268), [Italia]: Basilicata, Latronico, 20.IX.1909 (A. Andreini).
- etruscum* (*Lathrobium*), Piccioli, 1870: 307. Neotypus ♂ (454), [Italia: Toscana], Badia Prataglia (Arezzo), 28.VI.1928 (A. Andreini) [designato da Bordoni, 1972: 362].
- genganicum* (*Glyptomerus*) [= *Lathrobium*], Bordoni, 1972: 358. Holotypus ♂ (447) [Italia: Marche], Grotta di Frasassi, Genga (Ancona), VIII.1932 (A. Andreini). Paratypi ♀ ♀ (448), stessa località, 4.X.1924 e 31.VII.1935, 2 ex.
- grossetensis* (*Mesotyphlus*, subgen. *Dexiptyphlus*), Pace, 1979: 98. Holotypus ♂ (7272), [Italia: Toscana], Poggio Cavallo, dint. di Grosseto, 19.XI.1922 (A. Andreini).
- lacustre* (*Glyptomerus*) [= *Lathrobium*], Bordoni, 1972: 363. Holotypus ♂ (5568), [Italia: Lazio], Lago di Albano, II.1928 (A. Andreini). Paratypus ♀ (5569), stessi dati. [= *Lathrobium lanzai* Bordoni, 1984, nom. nov. in quanto *Lathrobium lacustre* Bordoni, 1972 è nom. preocc. da *Lathrobium lacustre* Casey, 1905].
- lanzai* (*Afrobium*), Bordoni, 1984 (in stampa). Holotypus ♂ (6871), Somalia: Taleh (in grotte), IV.1980 (S.B.S.), (*). Paratypus ♀ (6872), stessi dati, (*).
- pardii* (*Entomoculia*), Pace, 1977: 183. Holotypus ♂ (7277), [Italia: Toscana], M.ti Calvana (Firenze), V.1929 (A. Andreini). Allotypus ♀ (7278), stessi dati. Paratypi ♀ ♀ (7279), stessi dati, 2 ex.
- proximus* (*Scotonomus solarii* ssp.), Binaghi, 1970: 130. Holotypus ♂ (7264) [Italia]: Basilicata, Maratea, V.1909 (A. Andreini). Paratypus ♀ (7265), stessi dati.
- simpaticus* (*Scotonomus*), Binaghi, 1970: 124. Paratypi (7267), [Italia]: Sardegna, Dorgali, V.1910 (A. Dodero), 2 ex.

straneoi (*Glyptomerus*) [= *Lathrobium*], Schatzmayr & Koch, 1934: 259.

Syntypi ♂♂ e ♀♀ (450), [Italia]: Alpi Apuane, Foce di Mosceta, VII.1929 (A. Andreini), 13 ex.; (449), [Italia]: Alpi Apuane, Col di Favilla, VII.1929 e VIII.1933 (A. Andreini), 6 ex.

vignai (*Scotonomus*), Binaghi, 1970: 102. Paratypi ♂♂ e ♀♀ (7262), [Italia: Marche], Gola del Furlo (prov. Pesaro), IX.1928 (A. Andreini), 8 ex. Paratype (7263), stessa località, 19.IX.1938 (A. Andreini).

PSELAPHIDAE

bohemicus (*Euplectus*), Machulka, 1930: 45. Paratype ♂ (7286), [Cecoslovacchia]: Slov., Kosice (V. Machulka). [Sиноимо di *Euplectus bescidicus* Reitter secondo G. Castellini, *in litteris*].

lanzai (*Cliathrinus*), Castellini, 1974b: 303. Holotype ♂ (2026), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caiè, 6.IV.1902 (A. Andreini).

pardii (*Halorabyxis*), Castellini, 1974a: 184. Holotype ♂ (2018), Somalia: Sar Uanle, 7.XI.1971 (S.B.S.-P.L.), (*). Paratypi ♂♂ e ♀♀ (2019), Somalia: Sar Uanle, X-XI.1971 e VI.1973 (S.B.S.-P.L.), 83 ex., (*). Paratypi ♂♂ e ♀♀ (2020), stessi dati, 218 ex. (in alcol), (*).

vannii (*Tychobythinus*), Castellini, 1984: in stampa. Holotype ♂ (6108), [Italia: Toscana], grotta «Buca di Nadia», n. 732 T/PT (Piteccio, Pi-
stoia; m 325 s.l.m.), 23.VII.1983 (P. Magrini). Paratype ♀ (6109), stessa località, 25.IV.1983 (S. Vanni e S. Taiti).

SCARABAEOIDEA

LUCANIDAE

elenae (*Nigidius*), Bomans & Bartolozzi, 1984: 300. Holotype ♀ [coll. J. Simonetta c/o Museo Zoologico «La Specola»], Zaïre: Fiume Mongo, 19-24.III.1975 (A. Simonetta).

TROGIDAE

asmarensis (*Trox*), Balthasar, 1939: 32. Holotype (7169), [Etiopia]: Eritrea, Asmara, 16.IV.1901 (A. Andreini).

SCARABAEIDAE

(SCARABAEINAE, APHODINAE, MELOLONTHINAE, RUTELINAE)

- andreinii (Aphodius)*, Balthasar, 1939: 15. Holotypus (7093), [Etiopia]: Borana, Neghelli, primavera 1936 (E. Faà di Bruno).
- andreinii (Rhyssemus)*, Pittino, 1984: 47. Holotypus (7336), [Etiopia]: Eritrea, Debaroa, VII.1901 (A. Andreini). Paratypi (7337), stessi dati, 2 ex.
- barbata (Cephaloschiza)*, Decelle, 1979b: 256. Holotypus ♂ (6680), Rhodesia: Monze, Chikuni Mission, XI-XII.1929 (L. Cipriani). Allotypus ♀ (6686), stessi dati.
- beccarii (Rhyssemus)*, Balthasar, 1939: 27. Syntypi (7097), Guiana Inglese: Campo III sul Demerara, Tibicuri, Cujahà, X.1931 (Sped. N. Beccari), 30 ex.
- brunoi (Apogonia)*, Frey, 1976: 283. Holotypus (3165), Etiopia: Borana, Javello, XI-XII.1938-I-III.1939 (E. Faà di Bruno). Paratypi ♂♂ e ♀♀ (3166), stessi dati, 5 ex.
- ciliatus (Lepadoretus)*, Benderitter, 1929: 70. Syntypi ♂ e ♀ (7127), Somalia mer.: Vill. Duca Abruzzi, 1926 (Miss. ent. Paoli), 2 ex.
- cipriani (Aphodius)*, Balthasar, 1939: 22. Holotypus (7091), Rhodesia: Monze, Chikuni, I.1930 (L. Cipriani). Paratypi (7092), XI.1929-I.1930, 17 ex.
- cipriani (Paracopris)*, Balthasar, 1939: 3. Holotypus (7261), Rhodesia: Monze, Miss. di Chikuni, 15.XI-31.XII.1929 (L. Cipriani). Paratypus (7261), stessi dati.
- clypealis (Cestradoretes)*, Frey, 1976: 277. Holotypus ♂ (3173), Somalia: El Bur, 5-9.IX.1962 (S.B.S.), (*). Paratypus ♀ (3174), Somalia: Afmadù, 20-24.VIII.1970 (S.B.S.), (*).
- digitata (Anomala)*, Frey, 1976: 278. Holotypus ♀ (3171), Somalia: Dusa Mareb, 25.X.1973 (S.B.S.), (*). Paratypus ♀ (3172), stessi dati, (*).
- excavaticollis (Aphodius)*, Balthasar, 1939: 10. Holotypus (7089), Rhodesia: Monze, Miss. di Chikuni, X-XII.1929 (L. Cipriani). Paratypi (7090), stessi dati, 24 ex.
- exsecata (Camenta)*, Frey, 1976: 282. Holotypus (3158), Etiopia: Borana, Javello, XI-XII.1938-I-III.1939 (E. Faà di Bruno). Paratypus (3159), stessi dati.
- glabriceps (Rhinoptia)*, Frey, 1976: 279. Holotypus (3168), [Etiopia]: Eritrea, Karora, I-III.1938 (L. Cipriani). Paratypus (3169), stessi dati. Paratypi (3170), [Etiopia]: Eritrea, Barentù, I-III.1938 (L. Cipriani), 8 ex.

- granulifrons* (*Onthophagus*), Frey, 1961: 515. Paratypus (457), Somalia: Umgeb. Mogadiscio, VII.1959 (C. Koch).
- infuscatus* (*Adoretus rhamphorius* var.), Ohaus, 1939: 28. Paratypus ♀ (7184), [Etiopia]: Neghelli, I-IV.1936 (E. Faà di Bruno).
- longipes* (*Coelogenia*), Decelle, 1979b: 260. Holotypus ♂ (6690), Somalia: Villaggio Duca Abruzzi, VII.1926 (Miss. ent. Paoli). Allotypus ♀ (6691), stessi dati. Paratypi (6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697), Somalia: Villaggio Duca Abruzzi, III-VII.1926 (E. Faà di Bruno), 24 ex. Paratypi (6698), Somalia: Giohar, 18-28.IV.1968 (B. Lanza e A. Simonetta), 2 ex., (*). Paratypus (6699), Somalia: Afgoi, XI.1959 (A. Sammicheli). Paratypi (6700), Somalia: Alessandra, 1936 (F. Bigi), 3 ex.
- martellii* (*Onthophagus*), Frey, 1972: 313. Holotypus (512), Tanzania: Meru Crater, Naz. Park Arusa Distr., m 2500, IX.1967 (U. Funaioli). Paratypi ♀ ♀ (513), stessi dati, 2 ex.
- minor* (*Homeoschiza*), Decelle, 1979b: 257. Holotypus (6688), [Tanzania]: L. Tanganyika, Ugigi-Kigoma, X-XI.1930 (L. Cipriani).
- neghellinus* (*Aphodius*), Balthasar, 1939: 7. Holotypus (7100), [Etiopia]: Borana, Neghelli, I-IV.1936 (E. Faà di Bruno). Paratypi (7101), stessi dati, 2 ex.
- obbiana* (*Anomala*), Ohaus, 1939: 28. Syntypus (7183), Somalia: Obbia, 1924 (Stefanini e Puccioni).
- obbianus* (*Aphodius*), Balthasar, 1939: 13. Holotypus (7102), Somalia: Obbia, 1924 (Stefanini e Puccioni). Paratypi (7103), stessi dati, 4 ex.
- paolii* (*Lepadoretus*), Benderitter, 1929: 71. Holotypus ♂ (7126), Somalia: Villaggio Duca Abruzzi, IV-V.1926 (Miss. ent. Paoli).
- parisii* (*Rhyssemus*), Balthasar, 1939: 26. Holotypus (7096), [Etiopia]: Eritrea, Saati, 25.I.1901 (A. Andreini).
- parvulus* (*Ramphadoretus*), Benderitter, 1929: 71. Syntypi ♂♂ e ♀♀ (7125), Somalia: Villaggio Duca Abruzzi, III-IV.1926 (Miss. ent. Paoli), 4 ex.
- pavo* (*Aphodius*), Balthasar, 1939: 12. Holotypus (7098), Somalia: Gelib, Alessandra, IV.1937 (F. Bigi). Paratypi (7099), stessi dati, 2 ex.
- similis* (*Paracopris*), Balthasar, 1939: 4. Holotypus (7259), Rhodesia: Monze, Miss. di Chikuni, 15.XI-31.XII.1929 (L. Cipriani).
- simulator* (*Catharsius*), Balthasar, 1939: 5. Holotypus (7258), [Tanzania]: L. Tanganyika, Ugigi-Kigoma, X-XI.1930 (L. Cipriani).
- somalica* (*Pedaria*), Balthasar, 1939: 6. Syntypi (7257), Somalia: Obbia, Durgale-Magghiole, 1924 (Stefanini e Puccioni), 3 ex.

somalicola (Autoserica), Frey, 1976: 280. Holotypus (3160), Somalia: Giohar, 18-28.IV.1960 (B. Lanza e A. Simonetta), (*). Paratypi (3161, 3162), Somalia: Dusa Mareb, 25.X.1975 (S.B.S.), 2 ex., (*). Paratypus (3163), Somalia: fra Durgale e Maghiole, 1924 (Stefanini e Puccioni). Paratypus (3164), Somalia: Sar Uanle, II-III.1973 (S.B.S.-P.L.), (*).

somalicus (Campylophylus), Decelle, 1979b: 267. Holotypus (6704), Somalia, 1924 (Stefanini e Puccioni).

somalicus (Sybax), Balthasar, 1939: 29. Holotypus (7094), Somalia: Obbia, 1924 (Stefanini e Puccioni). Paratypi (7095), stessi dati, 7 ex.

somalina (Apogonia), Frey, 1976: 282. Holotypus (3167), Somalia: Geplib, Alessandra, IV.1937 (F. Bigi).

somalinus (Adoretus), Benderitter, 1929: 69. Syntypi ♂♂ e ♀♀ (7128), Somalia: Villaggio Duca Abruzzi, 12.X.1926 (Miss. ent. Paoli), 14 ex.

tetraphylla (Protoclitopa), Decelle, 1979b: 264. Paratypus ♂ (6703), [Tanzania]: L. Tanganyika, Ugigi-Kigoma, X-XI.1930 (L. Cipriani).

tibialis (Cnemoschiza), Decelle, 1979b: 262. Holotypus (6701), Somalia: Afgoi, XI.1959 (A. Sammicheli).

BUPRESTOIDEA

BUPRESTIDAE

accheleana (Sphenoptera), Obenberger, 1940: 11. «Typi» ♂ e ♀ (7212), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, IX.1902 (A. Andreini), 2 ex.

adiana (Sphenoptera), Kerremans, 1906: 95. Holotypus (7213), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié (A. Andreini).

aerosa (Steraspis dux var.), Obenberger, 1928: 129. «Typus» (7220), [Tanzania]: Usambara.

africanus (Polyonychus), Kerremans, 1906: 100. Holotypus (7235), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VIII.1901 (A. Andreini).

andreinii (Anthaxia), Kerremans, 1906: 97. Holotypus (7230), [Etiopia]: Eritrea, Chenafena, 23.IX.1901 (A. Andreini).

andreinii (Kamosia), Kerremans, 1906: 101. Holotypus (7240), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri (A. Andreini).

andreinii (Sphenoptera), Kerremans, 1906: 96. Holotypus (7214), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VIII.1901 (A. Andreini).

- aurora* (*Paracupta*), Obenberger, 1932: 211. «Typus» (7238), [Nuova Guinea]: Kieta, [Is.] Bougainville.
- azurescens* (*Sphenoptera*), Kerremans, 1906: 93. Holotypus (7256), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié (A. Andreini).
- bartoni* (*Acmaeodera*), Obenberger, 1940: 127. «Typus» (7225), [Grecia]: Creta, Leuka Ori [= Leuká Óre].
- bennigseni* (*Sternocera pulchra* var.), Kerremans, 1899: 273. Syntypus (6604), [Tanzania]: Afr. or., Njassasee.
- bohemica* (*Anthaxia fulgurans* ab.), Obenberger, 1938: 200. «Typus» ♂ (7226), [Cecoslovacchia]: Kovacov, Slovakia mer.
- bohemicus* (*Cylindromorphus*), Obenberger, 1933: 179. «Typus» (7222), [Cecoslovacchia]: env. de Prague, Boheme centr.
- bourgoini* (*Chrysochroa buqueti* var.), Obenberger, 1928: 123. «Typus» (7244), [Vietnam]: Annam.
- caieana* (*Sphenoptera*), Kerremans, 1906: 94. Holotypus (7255), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié (A. Andreini).
- communis* (*Acmaeodera multipunctata* ab.), Obenberger, 1934: 210. «Typus» (7228), Algeria: Batna (exp. Obenberger).
- curtii* (*Agrilus albogularis* var.), Obenberger, 1913: 32. «Typus» (7224), [Cecoslovacchia]: Pisek, 5.VII.1930.
- deceptorosus* (*Agrilus*), Obenberger, 1933b: 32. «Typus» (7233), [Brasile]: Sao Paulo (J. Mráz).
- elongatus* (*Meliboeus*), Kerremans, 1906: 99. Holotypus (7237), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri (A. Andreini).
- embrikiella* (*Cyphogastra javanica* var.), Obenberger, 1936: 108. «Typus» (7242), [Indonesia]: Halmaheira.
- erytraeina* (*Sphenoptera*), Kerremans, 1906: 92. Holotypus (7215), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié (A. Andreini).
- euchroea* (*Polybothris orbicularis* var.), Obenberger, 1928: 171. «Typus» (7246), Madagaskar.
- gemma* (*Polybothris sumptuosa* var.), Obenberger, 1928: 167. «Typus» (7248), Madagaskar: Betafo.
- lachesis* (*Polybothris*), Obenberger, 1924a: 64. Syntypi (7253), Madagascar: Ambanja, 4 ex.
- latifrons* (*Trachys*), Kerremans, 1906: 104. Holotypus (7218), [Etiopia]: Eritrea, Monti Dongollo (A. Andreini).
- linnei* (*Agrilus*), Obenberger, 1933a: 24. «Typi» (7234), Brasile: Sao Paulo (J. Mráz), 2 ex.
- lottei* (*Polybothris emarginata* var.), Obenberger, 1942: 41. «Typus» (7252), Madagaskar (coll. Plason).

- machulkai* (*Sternocera castanea rothschildi* ab.), Obenberger, 1935: 99.
 «Typus» (7221), Kenia: Laikipia, Uaso Nyiro, Afr. O. (Machulka).
- melichari* (*Kheilia*), Obenberger, 1923, *Zeitschr. Wiss. Ins. Biol.*, II: 114.
 Syntypus (7241), Perù: Puno (Soukup).
- minor* (*Paragrilus paulensis* var.), Obenberger, 1924a: 143. «Typus» (7254), Brasile: São Paulo (J. Mráz).
- mrazi* (*Taphrocerus*), Obenberger, 1924b: 63. «Typus» (7219), Brasile: São Paulo (J. Mráz).
- olsoufieviella* (*Polybothris*), Obenberger, 1942: 32. «Typus» (7245), Madagascar (coll. Nonfried).
- paulensis* (*Paragrilus*), Obenberger, 1924a: 142. «Typus» (7239), Brasile: São Paulo (J. Mráz).
- pragensis* (*Agrilus cyaneus* ab.), Obenberger, 1917: 214. «Typus» (7223), [Cecoslovacchia]: V. Osek, Boh[emia] (J. Steigervald).
- preyssleri* (*Agrilus*), Obenberger, 1933a: 19. «Typus» (7231), [Brasile]: São Paulo (J. Mráz).
- pseudosepulchralis* (*Anthaxia nigrojubata* var.), Obenberger, 1938: 227.
 «Typus» (7227), Grecia: [M.] Olympos, m 2100, 4.VI.1937, (coll. Barton).
- punctipennis* (*Aphanisticus*), Kerremans, 1906: 102. Holotypus (7229), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VII.1901 (A. Andreini).
- purpurescens* (*Chrysobothris*), Kerremans, 1906: 98. Holotypus (7243), [Etiopia]: Eritrea, Asmara, Arbaroba (A. Andreini).
- rutiliplaga* (*Polybothris sumptuosa* var.), Obenberger, 1928: 167. «Typus» (7249), Madagascar.
- sekerai* (*Agrilus*), Obenberger, 1933a: 13. «Typus» (7232), Brasile: São Paulo (J. Mráz).
- spesivcevi* (*Polybothris*), Obenberger, 1928: 174. «Typus» (7247), Madagascar.
- staudingerina* (*Lampetis*), Obenberger, 1917: 278. «Typus» (7251), Madagascar.
- subnodosa* (*Trachys*), Kerremans, 1906: 103. Holotypus (7217), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, Mai Daro (A. Andreini).
- ugriana* (*Sphenoptera*), Kerremans, 1906: 94. Holotypus (7216), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri (A. Andreini).
- zoufali* (*Polybothris*), Obenberger, 1928: 171. «Typus» (7250), Madagascar.
- xenia* (*Damarsila*), Obenberger, 1924a: 57. «Typus» (7236) «D. O. Afr.»: Manow.

ELATEROIDEA

ELATERIDAE

- aethiopicus* (*Propsephus*), Girard, 1976: 424. Holotypus (7181), Africa Orientale [ex] italiana: tra Bongo e Uota, 17.III.1939 (L. Cipriani).
- brachypilus* (*Pseudolophoeus*), Girard, 1984: *Ann. Soc. entomol. France*, (n.s.) 3 (in stampa). Holotypus (3080), [Etiopia]: Borana, Javello, XI.1938-III.1939 (E. Faà di Bruno).
- ineditus* (*Propsephus*), Girard, 1976: 427. Holotypus (3075), [Etiopia]: Borana, Javello, XI.1938-III.1939 (E. Faà di Bruno).
- pilosus* (*Anisomerus*), Girard, 1984: *Revue fr. Entomol.*, (n.s.) 3 (in stampa). Holotypus (3063), Somalia: Jesomma, 15.VIII.1968 (S.B.S.), (*). Paratypi (3064), stessi dati, 3 ex., (*). Paratype (3065), Somalia: Bud-Bud, 15.VIII.1968 (S.B.S.), (*).
- proximus* (*Propsephus*), Girard, 1984: *Ann. Soc. entomol. France*, (n.s.) 3 (in stampa). Holotypus (3077), Somalia: Gelib, Alessandra, IV.1937 (F. Bigi). Paratype (3078), stessi dati.
- zairensis* (*Eudicronychus*), Girard, 1948: *Revue franc. Entomol.*, (n.s.) 3 (in stampa). Paratypi (6787), Zaïre: Buie, 27.III-5.IV.1975 (S.B.Z.), 33 ex., (*).

CANTHAROIDEA

LAMPYRIDAE

- flavocostata* (*Luciola bimaculicollis* var.), Pic, 1928a: 21. Holotypus (7141), Somalia [ex] italiana: Margherita, VI.1913.
- latevittata* (*Luciola gaudens* var.), Pic, 1928a: 21. Holotypus (7142), Somalia [ex] italiana: Margherita, VI.1913.

BOSTRYCHOIDEA

PTINIDAE

- chiaromontei* (*Ptinus*), Pic, 1928a: 39. Holotypus (7166), Somalia [ex] italiana meridionale: Vill. Duca Abruzzi, III-IV.1926 (Miss. ent. Paoli).

MELYRIDAE
(inclusi MALACHIDAE)

- minutemaculatus* (*Pseudocoletes*), Wittmer, 1978: 100. Holotypus (6081), Somalia: Sar Uanle, 6.XI.1971 (S.B.S.-P.L.), (*). Paratypi (6078, 6079), stessa località, 3-10.XI.1971 e 28.V.1973 (S.B.S.-P.L.), 17 ex, (*).
- paolii* (*Mixis*), Pic, 1928b: 37. Holotypus (7138), Somalia [ex] italiana meridionale: Vill. Duca Abruzzi, 1926 (Miss. ent. Paoli). Paratypi (7139), Somalia [ex] italiana meridionale: Vill. Duca Abruzzi, IX.1926 (Miss. ent. Paoli), 3 ex.
- testaceipes* (*Pseudocoletes*), Pic, 1928b: 38. Holotypus (7140), Somalia [ex] italiana meridionale: Vill. Duca Abruzzi, X.1926 (Miss. ent. Paoli).

CUCUJOIDEA

COCCINELLIDAE

- erithraeae* (*Alesia trilineata* ssp.), Korschefsky, 1940: 72. Syntypus (7170), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VII.1901 (A. Andreini). 13 ex. Syntypus (7171), [Etiopia]: Eritrea, Conca di Bahat, 20.IX.1901 (A. Andreini).
- martellii* (*Nephus*), Fürsch, 1979: 21. Holotypus ♀ (2065), [Etiopia]. Eritrea, Adi-Caié, VIII.1902 (A. Andreini).
- somaliensis* (*Nephus*), Fürsch, 1978: 266. Holotypus (2063), Somalia: Sar Uanle, 13.VI.1973 (S.B.S.-P.L.), (*). Allotypus (3501), stessa località, 14.VI.1973 (S.B.S.-P.L.), (*). Paratypi (2064, 3502, 3503), stessa località, 17.V-8.VI.1973 (S.B.S.-P.L.), 3 ex, (*).
- zimmermanni* (*Solanophila*), Weise, 1922: 105: Syntypus (7172), [Tanzania]: Amani (Zimmermann).

TENEBRIONIDAE

- andreinii* (*Catomus*), Gridelli, 1940: 253. Holotypus (7191), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, IX.1902 (A. Andreini).
- andreinii* (*Gonocnemis*), Gridelli, 1940: 251. Holotypus ♀ (7190), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VIII.1901 (A. Andreini).
- andreinii* (*Hypophloeus*), Gridelli, 1940: 246. Paratypus (7188), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, 20.IV.1902 (A. Andreini).

- andreinii* (*Oxycara aethiopium* ssp.), Gridelli, 1940: 222. Holotypus (7186), [Etiopia]: Eritrea, Saganeiti, IV.1901 (A. Andreini). Paratypi (7187), stessi dati, 5 ex.
- andreinii* (*Pachychilina*), Dodero, 1916: 350. Syntypi (7185), [Libia]: Tripolitania, Misurata, X.1913 (A. Andreini), 4 ex.
- andreinii* (*Tenebrio*), Gridelli, 1940: 247. Syntypi (7192), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, IX.1901 (A. Andreini), 4 ex.
- carfii* (*Stenosis brenthoides* ssp.), Ardoïn, 1971: 46. Holotypus ♂ (129), Tunisia: Isola Gallo, arc. Galita, 2.VI.1966 (B. Lanza e S. Carfi). Allotypus ♀ (130), stessi dati. Paratypi (131), stessi dati, 6 ex.
- dubia* (*Oxycara aethiopium* ssp.), Gridelli, 1940: 223. Holotypus (7203), Etiopia: Dongollo, 29-30.XII.1900 (A. Andreini).
- erythraeus* (*Hypophloeus*), Gridelli, 1940: 245. Paratypi (7189), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, 20.IV.1902 (A. Andreini), 2 ex.
- erythraeus* (*Opatriinus corvinus* ssp.), Gridelli, 1940: 239. Syntypus (7210) [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, 16-30.VI.1901 (A. Andreini).
- griseovittatum* (*Gonocephalum*), Gridelli, 1940: 241. Syntypi (7193), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, V.1902 (A. Andreini), 4 ex. Syntypi (7194), [Etiopia]: Eritrea, Conca di Bahat, 16-21.IX.1901 (A. Andreini), 2 ex. Syntypus (7196), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, VII.1902 (A. Andreini). Syntypus (7197), [Etiopia]: Eritrea, Ghinda, 11.XI.1901 (A. Andreini). Syntypus (7195), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, 16-30.VI.1901 e V.1901 (A. Andreini), 2 ex.
- inhumeralis* (*Praogena*), Pic, 1928b: 43. Holotypus (7207), Somalia mer.: Villaggio Duca Abruzzi, 1926 (Miss. ent. Paoli).
- lanzai* (*Opatrum*), Ardoïn, 1971: 51. Holotypus ♂ (147), Tunisia: Isola Galitone, arc. Galita, 30.V.1966 (B. Lanza e S. Carfi). Allotypus ♀ (148), stessi dati. Paratypi (149), stessi dati, 5 ex.
- laticollis* (*Praogena*), Pic, 1928a: 25. Holotypus (7209), Somalia: Lugh, 26.X.1913.
- maltinii* (*Asida*), Ardoïn, 1971: 47. Holotypus ♂ (133), Tunisia: La Galite, 2-25.VIII.1968 (A. Ceccanti, G. Adriani e M. Romiti). Allotypus ♀ (134), Tunisia: Isola Galitone, arc. Galita, 30.V.1966 (B. Lanza e S. Carfi).
- maresi* (*Akis*), Ardoïn, 1971: 49. Holotypus ♂ (137), Tunisia: Isola Aguglia (= La Fauchelle) (arc. Galita), 1.VI.1966 (B. Lanza e S. Carfi). Allotypus ♀ (138), stessi dati. Paratypi (140), Tunisia: Isola Galitone, arc. Galita, 30.V.1966 (B. Lanza e S. Carfi), 2 ex.
- martellii* (*Heterocheira*), Ardoïn, 1974: 143. Holotypus (2001), Somalia: Sar Uanle, 6.XI.1971 (S.B.S.-P.L.), (*). Allotypus (2002), stessi dati,

(*). Paratypi (2003), Somalia: Sar Uanle, 20.X-14.XI.1971 (S.B.S.-P.L.), 22 ex, (*).

martellii (*Zophosis*), Ardoïn, 1974: 138. Holotypus ♂ (1095), Somalia: Sar Uanle, 23.X.1971 (S.B.S.-P.L.), (*). Allotypus ♀ (1096), Somalia: Sar Uanle, 3.XI.1971 (S.B.S.-P.L.), (*). Paratypi (1094), Somalia: Sar Uanle, 13.X-28.XI.1971 (S.B.S.-P.L.), 33 ex, (*).

parcepilosum (*Gonocephalum inquinatum* ssp.), Gridelli, 1940: 240. Paratypi (7211), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VII.1901 (A. Andreini), 3 ex.

rotundatum (*Gonocephalum*), Gridelli, 1940: 241. Syntypi (7198), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, IV-X.1902 (A. Andreini), 13 ex. Syntypus (7199), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VII.1901 (A. Andreini). Syntypi (7200), [Etiopia]: Eritrea, Saganeiti, IV.1901 (A. Andreini), 2 ex. Syntypi (7201), [Etiopia]: Eritrea, Altip. Goaita Assaorta, V.1902 (A. Andreini), 3 ex. Syntypi (7202); [Etiopia]: Eritrea, Adigrat, 23-25.IX.1901 (A. Andreini), 2 ex.

sardiniensis (*Pseudoseriscius olivieri* ssp.), Leo, 1982: 102. Paratypus (7204), [Italia]: Sardegna, Cagliari, Giorgino, 15.VIII.1976 (C. Meloni).

somalicus (*Diphyrrhinchus*), Ardoïn, 1974: 140. Holotypus ♂ (1098), Somalia: Sar Uanle, 9.XI.1971 (S.B.S.-P.L.), (*). Allotypus ♀ (1099), stessi dati, (*). Paratypi (2000), Somalia: Sar Uanle, 20.X-15.XI.1971 (S.B.S.-P.L.), 46 ex, (*).

stefaninii (*Strongylium*), Pic, 1928a: 25. Holotypus (7208), Somalia: Lugh, 26.X.1913.

sulcitana (*Pimelia angusticollis* ssp.), Leo & Pisano, 1978: 80. Paratypi (7205), [Italia]: Sardegna, prov. Cagliari, Porto Vesme, 20.IV.1975 (P. Leo), 2 ex.

ALLECULIDAE

rufithorax (*Pseudocistela*), Pic, 1928a: 24. Holotypus (7165), Somalia [ex] italiana: Giumbo, VI.1913.

MORDELLIDAE

andreinii (*Mordellistena*), Pic, 1933: 126. Syntypi (7134), [Etiopia]: Eritrea, M.te Dongollo, 25.I.1901 (A. Andreini), 2 ex. Syntypus (7135), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VIII.1901 (A. Andreini).

- erythraeana* (*Mordellistena*), Pic, 1933: 126. Syntypus (7136), [Etiopia]: Eritrea, M.te Dongollo, 25.I.1901 (A. Andreini).
reducta (*Anaspis 4-maculata* var.), Pic, 1933: 127. Syntypi (7137), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, VIII.1902 (A. Andreini), 6 ex.

ADERIDAE

- erythreus* (*Hylophilus*), Pic, 1933: 124. Syntypus (7143), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, VIII.1902 (A. Andreini).

MELOIDAE

- andreinii* (*Zonabris*), Pic, 1933: 123. Syntypi (7133), [Etiopia]: Eritrea, Maio, Assaorta Alta, VIII.1902 (A. Andreini), 5 ex.
lanzai (*Actenodia unimaculata* ssp.), Kaszab, 1973: 51. Holotypus (670), Somalia: Giohar, 28.IV.1968 (B. Lanza e A. Simonetta), (*). Paratypus ♀ (671), stessa località, 30.IV.1968 (B. Lanza), (*).
paolii (*Epicauta testaceipes* var.), Pic, 1928b: 41. Holotypus (7131), Somalia: Villaggio Duca Abruzzi, VIII.1926 (Miss. ent. Paoli).
paolii (*Zonitoschema eborina* var.), Pic, 1928a: 23. Holotypus (7132), Somalia: Matagassile, 1913.
postmarginata (*Coryna*), Pic, 1928b: 40. Holotypus (7130), Somalia: Villaggio Duca Abruzzi, I-III.1926 (Miss. ent. Paoli).
puccionii (*Mylabris tripartita* ab.), Kaszab, 1973: 46. Holotypus (657), Somalia, 1924 (Stefanini e Puccioni).
simillima (*Cyaneolytta depressicornis* ssp.), Kaszab, 1973: 54. Holotypus (632), Somalia: Afgoi, XI.1959 (A. Sammicheli).
somalica (*Coryna*), Kaszab, 1973: 48. Holotypus ♀ (668), Somalia: Kur-tum Uaro, 14.VIII.1959 (Missione Biologica in Somalia).

ANTHICIDAE

- andreinii* (*Anthicus*), Pic, 1933: 125. Holotypus (7152), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, V.1902 (A. Andreini).
andreinii (*Formicomus*), Pic, 1933: 124. Holotypus ♀ (7150), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VIII.1901 (A. Andreini).

- chiaromontei* (*Anthicus*), Pic, 1933: 126. Holotypus (7153), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, V.1902 (A. Andreini).
- hispidipennis* (*Anthicus*), Pic, 1933: 125. Holotypus (7151), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, VII.1902 (A. Andreini).
- paolii* (*Formicomus*), Krekich-Strassoldo, 1928: 384. Syntypi ♂♂ e ♀♀ (7154), Somalia mer.: Vill. Duca Abruzzi, 15.IX.1926 (Miss. ent. Paoli), 3 ex.

CHRYsomeLOIDEA

CERAMBICIDAE

- africanus* (*Linopteridius*), Villiers, 1972: 276. Paratypus (568), Somalia: Ola Uager, 15-18.VIII.1970 (S.B.S.), (*).
- albogrisea* (*Prosopocera octomaculata* ssp.), Breuning, 1940: 214. Holotypus (574), Somalia: Gelib, Alessandra, IV.1937 (F. Bigi).
- albovittatus* (*Parhippopsicon*), Breuning, 1978: 154. Holotypus (3617), Somalia: Dusa Mareb, 25.X.1973 (B. Lanza), (*).
- antennatus* (*Cantharocnemis*), Franz, 1938: 201. Holotypus (6910), Somalia: Obbia, Durgale-Magghiole, 1924 (Stefanini e Puccioni). Paratypi (6911), stessi dati, 2 ex.
- baldasseronii* (*Idactus*), Breuning, 1958: 107. Holotypus (578), Etiopia: Borana, Javello, XI-XII.1938-I-III.1939 (E. Faà di Bruno).
- basiruficornis* (*Exocentrus*), Breuning, 1958: 108. Holotypus (570), Somalia meridionale: Vill. Duca Abruzzi, IV-V.1926 (Miss. ent. Paoli).
- bituberosoides* (*Sophronica*), Breuning, 1972: 290. Holotypus (223), Somalia: Giohar, 18-28.IV.1968 (B. Lanza e A. Simonetta), (*). Paratypus (224), stessi dati, (*).
- brunoi* (*Lasiopezus*), Breuning, 1972: 286. Holotypus (221), Etiopia: Borana, Javello, XI-XII.1938-I-III.1939 (E. Faà di Bruno).
- distinguenda* (*Eunidia*), Aurivillius, 1928: 480. Holotypus (539), Somalia meridionale: Vill. Duca Abruzzi, IV-V.1926 (Miss. ent. Paoli) (coll. Paoli, Museo Civico di Genova).
- fuscolateralis* (*Phytoecia*), Breuning, 1977: 297. Holotypus (3627), Somalia: Sar Uanle, 24.X.1971 (S.B.S.-P.L.), (*). Paratypus (3625), stessa località, 31.X.1971, (*).
- macrophthalma* (*Eunidia*), Breuning, 1940: 217. Holotypus (575), Somalia: Gelib, Alessandra, IV.1937 (F. Bigi).

- martellii (Thapsyrus)*, Villiers, 1972: 278. Holotypus (215), Somalia: Giohar, 18-28.IV.1968 (S.B.S.), (*).
- meleagris (Eunidia)*, Aurivillius, 1928: 481. Holotypus (540), Somalia: Lugh, X.1913 (coll. Paoli, Museo Civico di Genova).
- metallescens (Sophronica)*, Breuning, 1978: 153. Holotypus (3678), Somalia: Baidoa, VII.1972 (S.B.S.), (*).
- monoxenoides (Jordanoleiopus)*, Breuning, 1972: 291. Holotypus (225), Somalia: Egggi, Vill. Duca Abruzzi, 22-26.VIII.1962 (Miss. Biol. Somalia 62).
- postbrunnea (Oberea)*, Breuning, 1977: 296. Holotypus (3626), Somalia: Sar Uanle, 6.XI.1971 (S.B.S.-P.L.), (*).
- quadrifasciata (Eunidia)*, Breuning, 1940: 218. Holotypus (576), Somalia: Gelib, Alessandra, IV.1937 (F. Bigi).
- rufolimbata (Brunoeme)*, Villiers, 1972: 275. Holotypus (214), Etiopia: Borana, Javello, XI-XII.1938-I-III.1939 (E. Faà di Bruno).
- sammichelii (Hololeprus)*, Villiers, 1972: 280. Holotypus (217), Somalia: Afgoi, IX.1959 (A. Sammicheli).
- somalica (Eunidia)*, Breuning, 1977: 294. Holotypus (3624), Somalia: Sar Uanle, 29.V.1973 (S.B.S.-P.L.), (*).
- somaliensis (Crossotus)*, Breuning, 1972: 289. Holotypus (222), Somalia: Jesomma, 15.VIII.1968.
- somaliensis (Derolus)*, Villiers, 1972: 280. Holotypus (216), Somalia: Giohar, 18-28.IV.1968 (B. Lanza e A. Simonetta), (*).
- somaliensis (Exocentrus)*, Breuning, 1958: 108. Holotypus (577), Etiopia: Borana, Javello, XI-XII.1938-I-III.1939 (E. Faà di Bruno).
- somaliensis (Hyllisia)*, Breuning, 1972: 284. Holotypus (219), Somalia: Giohar, 18-28.IV.1968 (B. Lanza e A. Simonetta), (*).
- somaliensis (Idactus)*, Breuning, 1972: 286. Holotypus (220), Somalia: Dinsor, 18-19.VII.1962 (Miss. Biol. Somalia 62).
- somaliensis (Mimononymoides)*, Breuning, 1972: 283. Holotypus (218), Somalia: Bur Dinsor, 23.VII.1962 (Miss. Biol. Somalia 62).
- somaliensis (Tetropiopsis)*, Villiers, 1972: 273. Holotypus (213), Somalia: Bender Cassim (Migiurtinia), 24.IV.1938 (Mordini).
- x-signata (Paramecyna)*, Breuning & Chelazzi, 1978: 175. Holotypus (3624), Zaïre: Fiume Mongo, 19-24.III.1975, (S.B.Z.), (*).

BRUCHIDAE

- arenarum (Caryedon)*, Decelle, 1979a: 84. Holotypus ♂ (6711), Somalia: dune tra Obbia e Durghale, 1924 (Stefanini e Puccioni).

- buettikeri* (*Bruchidius*), Decelle, 1979c: 321. Paratypus (6707), Somalia meridionale: Bar-Medeghé, 1924 (Stefanini e Puccioni).
- grandis* (*Caryedon*), Decelle, 1979a: 85. Holotypus ♂ (6712), Somalia: Run 7-19.VIII.1969 (S.B.S.), (*). Allotypus ♀ (6713), Somalia: Run (Garoë), 2.VIII.1964 (Miss. Biol. Somalia 1964). Paratypi (6714, 6715), Somalia: El Bur, 5-9.IX.1962 (Miss. Biol. Somalia 1962), 2 ex.
- somalicus* (*Callosobruchus*), Decelle, 1979a: 79. Holotypus ♂ (6705), Somalia: Sar Uanle, 13.VI.1973 (S.B.S.-P.L.), (*).
- somalicus* (*Spermophagus*), Decelle, 1979a: 82. Holotypus ♂ (6710), Somalia: Sar Uanle, 30.V.1973 (S.B.S.-P.L.), (*).

CHRYSOMELIDAE

- andreinii* (*Cassida*), Spaeth, 1933: 48. Holotypus (7162), [Etiopia]: Eritrea, Cheren, IV.1903 (A. Andreini).
- andreinii* (*Cryptocephalus decoratus* var.), Pic, 1933: 129. Syntypus (7160), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, Manara, 1901 (A. Andreini).
- apicalis* (*Anteriscus*), Pic, 1933: 130. Holotypus (7158), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VII.1901 (A. Andreini).
- atrimembris* (*Leucastea*), Pic, 1933: 128. Holotypus (7156), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VIII.1901 (A. Andreini).
- chiaromontei* (*Cryptocephalus decoratus* var.), Pic, 1933: 129. Syntypus (7159), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, Manara, V.1901 (A. Andreini).
- perpusilla* (*Dactylispa*), Gestro, 1911: 28. Syntypus (7163), [Etiopia]: Eritrea, Saganeiti, IV.1901 (A. Andreini). Syntypus (7164), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VIII.1901 (A. Andreini).
- testaceipes* (*Crioceris*), Pic, 1933: 128. Holotypus (7157), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, IX.1902 (A. Andreini).
- ugriensis* (*Cryptocephalus decoratus* var.), Pic, 1933: 129. Syntypus (7161), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VII.1901 (A. Andreini).

CURCULIONOIDEA

ANTHRIBIDAE

- targionii* (*Cratoparis*), Piccioli, 1877: 214. Holotypus (7364), [Italia: Toscana], dintorni di Firenze (Porte Sante).
- ricini* (*Misthosimella*), Jordan, 1929: 165. Holotypus ♀ (7363), Somalia mer.: Villaggio Duca Abruzzi (Miss. ent. Paoli).

BRENTHIDAE

- adustus (Cerobates)*, Senna, 1894b: 184. Syntypi (6937), [Indonesia]: Java Occ., Toegoe (J. D. Pasteur), 10 ex.
- aeneus (Ubanius)*, Senna, 1895a: 222. Syntypus ♀ (7004), Panama: Chiriquí, Amer. Centr. (don. Standinger).
- amazonicus (Raphidorrhynchus)*, Senna, 1894e: 598. Holotypus ♀ (7019), Brasile: Amazonas (don. Standinger).
- ambiguus (Diurus)*, Senna, 1909: 37. Holotypus ♂ (7050), [Sarawak]: N.W. Borneo, Kuching, 25.I.1900 (by Dyak coll., pres. 1900 by Shelford). Allotypus ♀ (7051), stessa località, 1.XI.1899.
- amplicollis (Raphidorrhynchus)*, 1894e: 597. Holotypus ♀ (7020), Brasile: Fonteboa (d. Standinger).
- andamanicus (Cerobates)*, Senna, 1896c: 223. Holotypus (6943), [India]: Is. Andaman (da E. André).
- andrewsi (Caenorychodes)*, Gahan, 1900: 117. Paratypi (7009), [Australia]: Christmas I., IV.1898 (C.W. Andrews), 4 ex.
- angulaticeps (Jonthocerus)*, 1898a: 53. Syntypi ♂♂ e ♀♀ (6925), [Indonesia]: Java occ. (J.D. Pasteur), 7 ex.
- angusticeps (Cyphagogus)*, Senna, 1893c: 296. Holotypus ♂ (6913), [Indonesia]: Sumatra, sul tabacco secco (A. Grouvelle).
- angustipennis (Cerobates)*, Senna, 1894b: 182. Syntypi (6936), [Indonesia]: Java occ., Toegoe (J.D. Pasteur), 9 ex.
- armaticeps (Cordus)*, Senna, 1894a: 559. Syntypus (6977), Nuova Guinea.
- articulatus (Diurus)*, Senna, 1909: 38. Holotypus ♂ (7047), Sarawak: N.W. Borneo, Kuching, 31.X.1899 (by Dyak coll., pres. 1900 by D.R. Shelford).
- aureopilosus (Trachelizus)*, Senna, 1889b: 105. Holotypus ♀ (6960), [Brasile]: Fonteboa (don. Standinger).
- australiana (Miolispa)*, Senna, 1897a: 58. Holotypus ♂ (6963), Australia: Victoria (ex Desbrochers). Allotypus ♀ (6964), stessi dati.
- australicus (Araiorrhinus)*, Senna, 1893c: 327. Holotypus (6948), Australia: New S. Wales (don. Faust).
- bicolor (Bolbocranius)*, Senna, 1898c: 371. Syntypi (7070), N. Camerun: Station J. Albrechts Höhe (Conradt), 8 ex.
- birmanicus (Cerobates)*, Senna, 1894c: 364. Syntypi (6940), N. Birmania: Rubis Mines (H. Doherty), 2 ex.
- birmanicus (Miolispoides)*, Senna, 1894c: 370. Holotypus ♂ (7000), Haute Birmanie: Mines d. Rubis (W. Doherty).

- borneensis (Miolispa)*, Senna, 1898b: 70. Holotypus ♂ (6965), Borneo (ex coll. Desbrochers).
- brevisulcatus (Microtrachelizus)*, Senna, 1894a: 558. Holotypus (6950), N. Guinea: Ighibirei, VII-VIII.1890 (L. Loria).
- cardoni (Symmorphocerus)*, Senna, 1894d: 385. Syntypi ♀ ♀ (6976), [India]: Barway (P. Cardon), 4 ex.
- carinensis (Jonthocerus)*, Senna, 1894c: 362. Syntypus ♀ (6926), [Birmania]: Carin Asciuii-Ghecù, 1400-1500 m, III-IV.1888 (L. Fea). Syntypus ♀ (6927), [Birmania]: Carin Chebà, 900-1000 m, V-XII.1888 (L. Fea). Syntypi (6995), Alta Birmania: Miniere di Rubini, 1200-2300 m, 2 ex.
- carinirostris (Schizotrachelus)*, Senna, 1892e: 489. Syntypus ♂ (7066), Birmania: Bhamo, VII.1886 (L. Fea).
- celebicus (Heteroclites)*, Senna, 1897b: 242. Syntypi (7042), [Indonesia]: S. Celebes, Lompa-Battau, 3000, III.1896 (H. Fruhstorfer), 5 ex. Syntypi (7043), [Indonesia]: S. Celebes, Bua-Kraeng, 5000, II.1896 (H. Fruhstorfer), 2 ex.
- ceylonicus (Euphenges)*, Calabresi, 1920b: 63. Holotypus ♂ (7015), Ceylon (A. Boucard).
- chiriquensis (Tmetogonus)*, Senna, 1895a: 225. Holotypus (7008), Amer. centr. [Panama]: Chiriquí (don. Standinger).
- cinereus (Ulocerus)*, Senna, 1896a: 208. Syntypus ♀ (7059), Brasile (d. Mus. Tring).
- cocoensis (Raphidorrhynchus)*, Calabresi, 1920b: 71. Holotypus ♂ (7021), Costa Rica: Is. de Coco, VI.1898.
- compressitarsis (Apterorhinus)*, Senna, 1896b: 59. Holotypus ♂ (7071), [Filippine]: S. Luzon, Albay, 1894 (Whitehead).
- compressithorax (Microsebus)*, Senna, 1898c: 370. Holotypus (6918), S.W. Cameroun: Stat. Lolodorf (Conradt).
- conradti (Jonthocerus)*, Senna, 1898c: 374. Holotypus ♂ (6932), N. Cameroun: Stat. J. Albrechts Höhe (Conradt).
- consanguineus (Raphirhynchus)*, Senna, 1895a: 217. Syntypi (7022), Venezuela: Merida (Tring Mus.), 4 ex.
- contiguus (Trachelizus)*, Senna, 1893a: 266. Holotypus (6952), [Indonesia]: Engano, Malaconni, VI.1891 (E. Modigliani).
- costipennis (Acramorphocephalus)*, Calabresi, 1920c: 66. Syntypus ♂ (6981), N. Cameroun: Stat. J. Albrechts Höhe (Conradt). Syntypus ♀ (6982), Congo Franç. [Rep. Dem. Congo]: Bénito.
- costipennis (Oncodemerus)*, Senna, 1892c: 157. Holotypus ♂ (6917), Gabon (da Standinger).

- crassus (Pseudorychodes)*, Senna, 1894c: 378. Paratypus (7013), Alta Birmania: Min.e rubini (H. Doherty).
- cruiciata (Miolispa)*, Senna, 1898b: 69. Holotypus ♂ (6966), N. Borneo (ex coll. Fruhstorfer).
- cruentatus (Cerobates)*, Senna, 1898c: 372. Holotypus ♂ (7088), N. Camerun: Stat. Joh. Albrechts Höhe (Conradt).
- discors (Miolispa)*, Senna, 1895b: 358. Holotypus ♀ (6967), [Malesia]: Penang [= Pinang] (ex A. Boucard).
- emmae (Hopliterrhynchus)*, Senna, 1892b: 26. Holotypus ♂ (7032), Malesia (A. Boucard).
- enganica (Miolispa)*, Senna, 1893a: 267. Paratypus ♂ (7001), [Indonesia]: Engano, Bua-Bua, V-VI.1891 (E. Modigliani).
- exportatus (Araiorrhinus)*, Senna, 1893c: 327. Holotypus (6946), [Indonesia]: Sumatra, imp. c. tabacco (da Grouvelle).
- fausti (Araiorrhinus)*, Senna, 1893c: 325. Syntypi ♂♂ (6957), S.O. Camerun: Stat. Lolodorf (H. Conradt), 2 ex.
- feae (Callipareius)*, Senna, 1892e: 445. Paratypus ♂ (6919), Birmania: Carin [montagne], Ghecù [distretto], 1300—1400 m, V.1888 (L. Fea).
- festivus (Brenthus)*, Senna, 1897a: 232. Holotypus ♂ (7080), Columbia: Canca (d. Standing). Paratypi (7082), Venezuela: Merida, 12 ex. Paratypi (7083), Panama: Chiriqui, 2 ex. Paratypi (7081), Columbia (A. Boucard), 5 ex.
- filicauda (Diurus)*, Senna, 1909: 47. Holotypus ♂ (7055), Sarawak: Borneo (da Standing). Allotypus ♀ (7056), [Sarawak]: N.W. Borneo: Kuching capt., 25.I.1900 (by Dyak coll., pres. 1900 by Shelford).
- flavornatus (Cephalobarus macrocephalus var.)*, Senna, 1889a: 35. Syntypi ♂ e ♀ (7073), Columbia: [rio] Canca (d. Standing), 2 ex.
- forcipitigerus (Arrhenodes)*, Gyllhenhal, 1840: 478. Paratypus ♂ (7078), Cuba (A. Boucard).
- foveatus (Callipareius)*, Senna, 1894d: 384. Paratypus (6920), [India]: Kurseong (P. Kraet).
- foveolatus (Jonthocerus)*, Senna, 1893c: 300. Lectotypus ♂ (6930), [Indonesia]: Sumatra, imp. in Europa col tabacco secco (Grouvelle) [designato da Damoiseau, *in litteris*].
- fruhstorferi (Prodector)*, Senna, 1897b: 241. Syntypi (7044), [Indonesia]: S. Celebes, Bua-Kraig, 5000, II.1896 (H. Fruhstorfer), 8 ex.
- fruhstorferi (Pseudorychodes)*, Senna, 1894c: 375. Allotypus ♀ (7011), [Indonesia]: Java occ., m. Tjikorae, 4000, 1892 (H. Fruhstorfer).
- funebris (Arrhenodes)*, Sharp, 1895: 44. Syntypi ♂♂ e ♀♀ (7002), Panama: V. de Chiriqui, 25-4000 ft (Champion), 4 ex.

- fusca (Heteroblysmia)*, Calabresi, 1920c: 66. Holotypus ♂ (7017), [Sarawak]: N.W. Borneo, Kuching, 11.VII.1900 (by Dyak coll., pres. 1900 by Shelford).
- gestri (Pithoderes)*, Calabresi, 1920d: 43. Holotypus ♂ (7067), [Rep. Pop. Congo]: Bènito.
- gestroi (Stereodermus)*, 1893a: 261. Syntypi (6934), [Indonesia]: Engano, Bua-Bua, V-VI.1891 (E. Modigliani), 3 ex.
- gestroi (Uropterus)*, Senna, 1894a: 562. Syntypi (7060), N. Guinea: Ighibirei, VII-VIII.1890 (L. Loria), 3 ex.
- grouvellei (Cerobates)*, Senna, 1893c: 307. Lectotypus ♀ (6938), [Indonesia]: Sumatra, imp. c. tabacco (da Grouvelle) [designato da Damoiseau, *in litteris*].
- grouvellei (Higonius)*, Senna, 1893c: 311. Holotypus (6944), [Indonesia]: Sumatra, imp. c. tabacco (da Grouvelle).
- guatemalensis (Nemocephalus)*, Senna, 1893b: 128. Syntypi (7069), Guatemaala (A. Boucard), 2 ex.
- guatemalenus (Claedoderes)*, Sharp, 1895: 52. Syntypus ♂ (7074), Guatemaala: Capetillo (G.C. Champion). Syntypus ♀ (7124), Guatemala: Cerro Zunil, 4-5000 ft (Champion).
- hirsutus (Hyperephanus)*, Senna, 1892c: 155. Holotypus (6933), Cile (ex coll. Boucard).
- hybridus (Cerobates)*, Senna, 1898c: 371. Holotypus (6939), N. Kamerun: Station Albrechts Höhe (L. Conradt).
- insculptus (Raphidorrhynchus)*, Senna, 1889a: 36. Holotypus ♀ (7023), Brasile: Fonteboa (d. Standinger).
- insularis (Trachelizus)*, Senna, 1892a: 163. Holotypus ♀ (6961), [Maleisia]: Is. Penang [= Pinang], (A. Boucard). Allotypus ♂ (6962), [Indonesia]: Giava (A. Boucard).
- intermedia (Miolispa)*, Senna, 1897b: 239. Holotypus ♂ (6984), [Indonesia]: Nord Celebes, Toli-Toli, XI-XII.1895 (H. Fruhstorfer).
- intermedius (Diurus)*, Senna, 1909: 41. Holotypus (7049), [Sarawak]: N.W. Borneo, Kuching. capt., 20.III.1900 (by Dyak coll., pres. 1900 by R. Shelford).
- intermedius (Schizotrachelus)*, Senna, 1892e: 481. Syntypi (7061), Indonesia: Java occ. (W. Pasteur).
- interruptus (Schizotrachelus)*, Senna, 1898b: 72. Holotypus ♂ (7065), [Maleisia]: Is. Penang [= Pinang] (d. Standinger).
- iridescens (Euphenges)*, Calabresi, 1920b: 65. Syntypi ♂ e ♀ (7016), [Maleisia]: Is. Penang [= Pinang] (A. Boucard), 2 ex.

- javanica* (*Miolispa*), Senna, 1892a: 167. Paratypi (6990), [Indonesia]: Java occ. (W. Pasteur), 27 ex.
- jordani* (*Miolispa*), Senna, 1895b: 360. Holotypus ♂ (6983), [Malesia]: Is. Penang [= Pinang] (ex. Boucard).
- kleinei* (*Anepsiotes*), Calabresi, 1920b: 68. Paratypi (7036), [Malesia]: Is. Penang [= Pinang] (A. Boucard), 2 ex.
- kraatzi* (*Cordus*), Senna, 1898c: 375. Holotypus ♂ (6978), S.O. Camerun: Station Lolodorf (L. Conradt).
- laevigatus* (*Trachelizus*), Senna, 1898a: 58. Holotypus (7086), [Indonesia]: Java occ., 1895 (W. Pasteur).
- laevis* (*Usambius conradti* var.), Senna, 1898: 370. Syntypi (6915), N. Camerun: Station J. Albrechts Höhe (L. Conradt), 2 ex. Syntypi (6916), stessa località (ex Dr. Kraatz), 2 ex.
- laevipennis* (*Cerobates*), Senna, 1896c: 219. Syntypus ♂ (6935), [Indonesia]: Is. Sanghi [= Sangis].
- lamellipes* (*Fontebuanus*), Senna, 1893b: 125. Holotypus ♂ (7068), Brasile: Fonteboa, Amazon. Fl., 1889 (Standinger).
- linearis* (*Raphidorrhynchus*), Senna, 1894e: 607. Holotypus ♀ (7024), Messico: Sierra de Durango (d. A. Boucard).
- lineata* (*Miolispa*), Senna, 1898a: 57. Paratypi ♂♂ (6985), [Indonesia]: Java occ., 1895 (W. Pasteur), 4 ex.
- luzonicus* (*Anepsiotes*), Calabresi, 1920b: 66. Holotypus ♂ (7038), Filippine: N. Luzon, 1894 (Whitehead).
- maculipennis* (*Brenthus*), Senna, 1897a: 234. Holotypus ♂ (7079), Ecuador (A. Boucard).
- marginatus* (*Schizotrachelus*), Senna, 1898b: 75. Holotypus ♂ (7063), Nord Borneo (ex coll. Fruhstorfer). Allotypus ♀ (7064), stessi dati.
- mariae* (*Miolispa*), Senna, 1891: 165. Holotypus ♂ (6988), [Malesia]: Is. Penang [= Pinang] (da A. Boucard). Paratypus ♂ (6989), stessi dati.
- major* (*Stratiorrhina*), Calabresi, 1921a: 47. Syntypi (7005), Borneo (A. Boucard), 2 ex. Syntypus (7006), N.W. Borneo, Kuching capt., 17.VII.1900 (by Dyak coll. on flowering tree, pres. 1900 by Shelford). Syntypus (7007), Sumatra (Dohrn) (don. Dr. Faust).
- metallica* (*Miolispa*), Senna, 1892a: 169. Syntypi (6994), [Indonesia]: Java occ., 1895 (W. Pasteur), 26 ex.
- metallicus* (*Schizotrachelus*), Senna, 1897b: 240. Syntypus (7062), [Indonesia]: S. Celebes, Lompa-Battau, 3000, III.1896 (H. Fruhstorfer), 2 ex.
- modestus* (*Trachelizus*), Senna, 1892a: 165. Syntypus (7087), [Indonesia]: Java (da F.P. Pascoe).

- modiglianii* (*Cyphagogus*), Senna, 1893a: 258. Paratypi ♂ e ♀ (6912), [Indonesia]: Engano, Bua-Bua, 5.VI.1891 (E. Modigliani), 2 ex.
- mutabilis* (*Prophthalmus*), Senna, 1893a: 274. Syntypi (6971), [Indonesia]: Engano, Bua-Bua, V-VI.1891 (E. Modigliani), 13 ex.
- niassicus* (*Higonius*), Senna, 1893c: 310. Holotypus ♂ (6945), [Indonesia]: Is. Nias (Jordan) (ex coll. Faust).
- nitidicollis* (*Anepsiotes*), Calabresi, 1920b: 69. Holotypus ♂ (7037), Philippines: Manila (Whitehead).
- nitidissimus* (*Proephebocerus*), Calabresi, 1920a: 39. Holotypus ♂ (6958), Madagascar: Andrangoloaka, 1600 m O.S.O. de Tananarive. Allotypus ♀ (6959), Madagascar: S de la Baie de Antongil.
- nonfriedi* (*Miolispa*), Senna, 1895b: 363. Holotypus ♂ (6986), Nuova Guinea (coll. Nonfried). Allotypus ♀ (6987), stessi dati.
- nupta* (*Miolispa*), Senna, 1892a: 171. Syntypi (7085), [Indonesia]: Java occ. (J.D. Pasteur), 20 ex.
- oberthueri* (*Hoplopisthius*), Senna, 1892d: 255. Syntypus ♂ (6954), Birmania: Min.a di rubini, Alta Birmania, m 1200-2300 (Doherty).
- orientalis* (*Pseudobelopherus*), Calabresi, 1920b: 61. Holotypus ♂ (7034), Malacca (Roelofs). Allotypus ♀ (7035), Malacca (A. Boucard).
- ornatus* (*Heterorrhynchus*), Calabresi, 1921b: 63. Holotypus ♂ (7033), Borneo, 1894 (M. Vallier).
- panamensis* (*Raphidorrhynchus*), Senna, 1894e: 609. Holotypus ♀ (7025), Panama (A. Boucard).
- pasteuri* (*Jonthocerus*), Senna, 1898a: 55. Holotypus ♂ (6928), [Indonesia]: Java occ. (J.D. Pasteur). Paratypus (6929), stessi dati.
- pasteuri* (*Miolispa*), Senna, 1898a: 56. Paratypus ♂ (6974), [Indonesia]: Java occ. (D. Pasteur).
- philippinus* (*Diurus*), Senna, 1909: 45. Syntypi (7054), [Filippine]: N. Luzon, 1894 (Whitehead), 10 ex.
- poultoni* (*Diurus*), Senna, 1909: 44. Syntypi (7053), Sarawak: N.W. Borneo, Kuching capt., 13.VII.1899 (by Dyak coll., pres. 1900 by Sheldford), 2 ex. Syntypi (7054), stessa località, 12.XII.1899, 2 ex.
- propinquus* (*Acratus*), Senna, 1889b: 108. Holotypus ♂ (7075), Brasile: Fonteboa (d. Standinger). Allotypus ♀ (7076), stessi dati.
- pubescens* (*Microtrachelizus*), Senna, 1893c: 320. Holotypus (6949), [Indonesia]: Sumatra, s. tabacco (A. Grouvelle).
- punctulatus* (*Cerobates*), Senna, 1898c: 373. Holotypus ♂ (6941), N. Kalimantan: Station J. Albrechts Höhe (L. Conradt).
- pygmoea* (*Miolispa*), Senna, 1895b: 360. Allotypus ♀ (6991), [Malesia]:

- Is. Penang [= Pinang] (da A. Boucard). Paratypus ♂ (6992), stessi dati.
- queenslandicus (Cordus)*, Senna, 1918: 80. Holotypus ♂ (6979), [Australia]: Peak Down Stat. Queenslaand (ex Mus. Godefroy).
- quadrituberculatus (Agriorrhynchus)*, Senna, 1892e: 470. Holotypus (6970), [Birmania]: Carin [montagne] Chebà [distretto], 900-1100, V-XII.1888 (L. Fea).
- quadrifasciatus (Estenorhinus)*, Senna, 1897a: 232. Holotypus ♂ (7003), Colombia (A. Boucard).
- recticauda (Ulocerus)*, Senna, 1896a: 199. Holotypus ♂ (7057), Brasile (A. Boucard). Paratypi (7058), stessi dati, 6 ex.
- ritsemae (Orychodes)*, Senna, 1891: 161. Holotypus (7014), [Penisola di Malacca (A. Boucard).
- rostralis (Neocephalus)*, Senna, 1898c: 376. Holotypus ♂ (6956), N. Camerun: Stat. Albrechts Höhe (Conradt).
- rubicundus (Eterozemus)*, Damoiseau, 1967: 8. Holotypus ♂ (6924), [India]: Assam, Khasia Hills (Heyne).
- rubrosignatus (Caenorhynchodes)*, Kleine, 1921: 95. Paratypi ♂ e ♀ (7010), [Indonesia]: Molucche, Ternate, 1875 (Bruijn), 2 ex.
- rudis (Baryrrhynchus)*, Senna, 1893a: 280. Syntypi ♂ ♂ e ♀ ♀ (6968), [Indonesia]: Engano, Bua-Bua, V-VI.1891 (E. Modigliani), 13 ex.
- ruficornis (Prophthalmus)*, Senna, 1902a: 174. Syntypus ♂ (6973), Indonesia: Sumatra, Si Rambé (E. Modigliani).
- sculpturatus (Neocephalus)*, Senna, 1898c: 377. Holotypus ♀ (6955), S.O. Camerun: Lolodorf (L. Conradt).
- severini (Raphidorrhynchus)*, Senna, 1894e: 602. Holotypus ♂ (7026), Messico (A. Boucard).
- sexnotatus (Mesoderes)*, Senna, 1898b: 66. Syntypi ♂ e ♀ (6922), Nuova Guinea: Humboldt Bay, IX-X.1893 (W. Doherty), 2 ex.
- sexvittatus (Raphidorrhynchus)*, Senna, 1894e: 596. Syntypus ♂ (7027), Panama (A. Boucard). Syntypus ♀ (7028), Amer. centr. [Panama]: Chiriquì (d. Standinger).
- shelfordi (Diurus)*, Senna, 1902b: 279. Syntypi ♂ e ♀ (7046), Sarawak: N.W. Borneo, Kuching capt., 27.VII.1899 e 5.VIII.1899 (by Dyak coll., pres. 1900 by R. Shelford), 2 ex.
- silvanus (Diurus)*, Senna, 1902a: 177. Holotypus ♂ (7048), [Indonesia]: Sumatra, Si Rambé, XII.1890-III.1891 (E. Modigliani).
- silvicola (Microtrachelizus)*, Senna, 1902a: 168. Syntypus (6951), Malacca (ex coll. Boucard).

- simulans* (*Miolispa*), Senna, 1895b: 362. Holotypus ♂ (6996), Nuova Guinea (coll. Nonfried). Paratypi (6997), stessi dati, 5 ex.
- singularis* (*Eterodiurus*), Senna, 1909: 52. Holotypus ♂ (7045), N. India (?) (A. Boucard).
- sondaicus* (*Araiorrhynus*), Senna, 1893c: 329. Holotypus (6947), [Indonesia]: Sumatra, sul tabacco (da A. Grouvelle).
- sondaicus* (*Jonthocerus*), Senna, 1893c: 302. Syntypus ♂ (6931), [Indonesia]: Sumatra, importat. in Europa col tabacco secco (A. Grouvelle).
- squamifer* (*Pseudocyphagogus*), Desbrochers des Loges, 1890: 221. Neotypus (6921), Borneo: Banguey (ex Desbrochers) [Damoiseau, *in litteris*].
- sulcatus* (*Amorphocephalus*), Calabresi, 1920c: 64. Holotypus ♀ (6969), Sudan (da Standinger).
- scutellaris* (*Opisthozemius*), Damoiseau, 1967: 5. Holotypus ♀ (6923), [Indonesia]: Sumatra, Parlembang (R. Donckier).
- sumatrana* (*Cerobates*), Senna, 1893c: 306. Holotypus ♂ (6942), [Indonesia]: Sumatra, tabac. imp. (A. Grouvelle).
- sycophanta* (*Miolispa*), Senna, 1893a: 270. Paratypus ♂ (6993), [Indonesia]: Engano, Bua-Bua, V-VI.1891 (E. Modigliani).
- tabaci* (*Microtrachelizus*), Senna, 1893b: 323. Holotypus (6953), [Indonesia]: Sumatra, s. tabacco (A. Grouvelle).
- tabacicola* (*Cyphagogus*), Senna, 1893c: 294. Lectotypus (6914), [Indonesia]: Sumatra, sul tabacco secco (A. Grouvelle) [designato da Damoiseau, *in litteris*].
- tenuirostris* (*Pseudorychodes*), Senna, 1894c: 376. Holotypus ♀ (7012), [Birmania]; Haute Birmanie, Mines de rubis, 1200-2300 m.
- timoriensis* (*Schizotrachelus*), Senna, 1898b: 74. Holotypus ♂ (7084), [Indonesia]: Timor (acq. Donekiew).
- trachelizoides* (*Miolispa*), Senna, 1894b: 193. Syntypus ♂ (6975), [Indonesia]: Sumatra (ex Dr. Faust).
- tristis* (*Cediocera*), Senna, 1892a: 181. Syntypi (7039), [Indonesia]: Java occ. (J.D. Pasteur), 25 ex. Syntypi (7040), [Indonesia]: Engano, Bua-Bua, V-VI.1891 (E. Modigliani), 6 ex. Syntypi (7041), [Malesia]: Perak (d. Standinger), 5 ex.
- tristis* (*Claedoderes mexicanus* var.), Senna, 1889b: 107. Syntypi ♂ e ♀ (7077), [America meridionale]: Amazonas (d. Standinger), 2 ex.
- tuberculatipennis* (*Miolispa*), Senna, 1897b: 237. Holotypus ♂ (6998), [Indonesia]: S. Celebes, Lompa-Battau, 3000, III.1896 (H. Fruhstorfer).

- Allotypus ♀ (6999), [Indonesia]: S. Celebes, Bua-Kraeng, 5000, II.1896 (H. Fruhstorfer).
- variabilis* (*Raphidorrhynchus*), Senna, 1894e: 606. Syntypi (7029), Messico: Oajaca (ex Mus. Belg.), 3 ex.
- versicolor* (*Prophthalmus*), Senna, 1892e: 466. Syntypi ♂ e ♀ (6972), [Birmania]: Carin Chebà, 900-1100 m, V-XII.1888 (L. Fea), 2 ex.
- vicinus* (*Cordus*), Senna, 1918: 82. Holotypus ♂ (6980), New South Wales: Auckland (Dohrn).
- vicinus* (*Raphirynchus*), Senna, 1894e: 599. Syntypi (7030), Brasile: Petrópolis (A. Boucard), 2 ex. Syntypi (7031), Brasile: Rio Janeiro (ex Standinger), 2 ex.
- vittata* (*Heteroblysmia*), Calabresi, 1921b: 65. Holotypus ♂ (7018), Sarawak: Borneo (A. Boucard).

CURCULIONIDAE

- andreinii* (*Apion*), Wagner, 1910: 155. Holotypus ♂ (7118), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VII.1901 (A. Andreini). Allotypus ♀ (7119), stessi dati. Paratypi (7120), stessi dati, 15 ex.
- araticollis* (*Lixus*), Marshall, 1939: 295. Paratypi ♂ ♂ e ♀ ♀ (7108), Rhodesia: Monze, I-III.1929 (L. Cipriani), 8 ex.
- bruchiana* (*Ctenomyophila*), Heller, 1920: 240. Syntypi (7110), [Argentina]: Buenos Aires, 2 ex.
- cipriani* (*Larinus*), Marshall, 1939: 297. Holotypus ♂ (7114), Rhodesia: Monze, I-III.1929 (L. Cipriani). Paratypi (7115), stessi dati, 3 ex.
- crassulus* (*Haplocorynus*), Marshall, 1939: 300. Paratypus ♂ (7109), Rhodesia: Monze, Miss. di Chikuni, 15.XI-31.XII.1929 (L. Cipriani).
- dongollanum* (*Apion*), Wagner, 1910: 154. Syntypi ♂ e ♀ (7122), [Etiopia]: Eritrea, Monte Dongollo, 25.I.1901 (A. Andreini), 2 ex.
- gilvipes* (*Brachycerus*), Colonnelli, 1979: 247. Paratypus (6716), Somalia: Sar Uanle, VII-VIII.1975 (S.B.S.-P.L.), (*).
- incognitus* (*Arniticus*), Hustache, 1938: 40. Paratypus ♀ (7106), Guiana [ex] inglese: Paradise, Berbice, XII.1931 (Sped. N. Beccarii).
- insertum* (*Apion*), Wagner, 1910: 154. Syntypus (7116), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Caié, IV.1902 (A. Andreini). Syntypi (7117), [Etiopia]: Eritrea, Adi-Ugri, VIII.1901 (A. Andreini), 4 ex.
- liratus* (*Blosyrus*), Marshall, 1939: 289. Syntypi (7105), Rhodesia: Monze, Miss. Chikuni, I-III.1929 (L. Cipriani), 3 ex. Syntypus ♂ (7104), stessa località, 15.XI-31.XII.1929 (L. Cipriani).

- litoralis* (*Hypohippurus*), Colonnelli, 1979: 251. Holotypus (6717), Somalia: Sar Uanle, 31.V.1973 (S.B.S.-P.L.), (*). Paratypi (6718), Somalia: Sar Uanle, 31.V-20.VI.1973 (S.B.S.-P.L.), 9 ex, (*).
- moerens* (*Nanophyes*), Marshall, 1939: 298. Paratype ♂ (7111), Rhodesia: Monze, I-III.1929 (L. Cipriani).
- persimilis* (*Eubulus*), Hustache, 1938: 42. Holotypus (7107), Guiana [ex] inglese: Campo V fra Canister Falls e Kurupukari, IX.1931 (Sped. N. Beccari).
- rhaeticus* (*Balaninus*), Fuchs, 1862: 423. Holotypus (7123), Schweiz: [Poschiavo].
- rotundatum* (*Apion*), Wagner, 1910: 154. Holotypus ♂ (7121), [Etiopia]: Eritrea, Sabderat, XI.1901 (A. Andreini).
- simplex* (*Somerenius*), Marshall, 1939: 291. Holotypus ♀ (7112), Rhodesia: Monze, I-III.1929 (L. Cipriani).
- strabo* (*Synaptocephalus*), Marshall, 1939: 292. Paratype ♀ (7113), Rhodesia: Monze, I-III.1929 (L. Cipriani).

OPERE CITATE

- ARDOIN P. (1971) - Tenebrionidae (Coleoptera) récoltés par l'expedition Mares dans l'archipel de la Galite, Tunisie. *Nouv. Revue Ent.*, **1**, 45-52.
- ARDOIN P. (1974) - Recherches sur le littoral de la Somalie. La plage et la dune de Sar Uanle. I. Tenebrionidae (Coleoptera). *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **5** (12), 133-145.
- AURIVILLIUS C. (1928) - Neue Cerambyciden aus dem Somaliland und Abessinien in Museo Civico di Storia Naturale in Genova. *Annali Mus. civ. Stor. nat. Genova*, **52**, 473-486.
- BACCHUS M.E. (1978) - A catalogue of the type-specimens of the Scarabaeinae (Scarabaeidae) and the smaller lamellicorn families (Coleoptera) described by G.J. Arrow. *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.)*, **37** (3), 97-115.
- BALTHASAR V. (1939) - Neue Arten der coprophagen Scarabaeiden aus dem Museo Zoológico della R. Università di Firenze. *Redia*, **25**, 1-36.
- BASILEWSKY P. (1968) - Note sur les Coléoptères Carabidae de Somalie des Collections du Musée Zoologique de Florence. *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **2**, 1-16.
- BASILEWSKY P. (1978) - Description d'une nouvelle race somalienne de *Megacephala regalis* Boheman (Col. Carabidae Cicindelinae). *Rev. zool. afr.*, **92** (3), 771-772.
- BENDERITTER E. (1929) - Adorétides nouveaux de la Somalie Italienne. *Mem. Soc. ent. ital.*, **8** (1), 69-72.
- BINAGHI G. (1970) - Revisione degli *Scotonomus*. Analisi di un genere paleotirrenico (Coleoptera Staphylinidae). *Boll. Soc. ent. ital.*, **102** (7-8), 118-137.
- BOMANS E., BARTOLOZZI L. (1984) - *Nigidius helenae* n. sp., nouveau Lucanide du Zaïre. *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **19** (10), 299-303.

- BORDONI A. (1969) - Una nuova specie di *Cylindropsis* s. str. (Coleoptera Staphylinidae). *Redia*, **51**, 123-126.
- BORDONI A. (1972) - I *Glyptomerus* dell'Appennino centrale e settentrionale e descrizione di nuove specie (Coleoptera Staphylinidae). *Redia*, **53**, 347-371.
- BORDONI A. (1980) - Studi sui Paederinae. X. Una nuova specie di *Achenium* dell'Afghanistan (Col. Staphylinidae). *Redia*, **63**, 323-325.
- BORDONI A. (1984) - Intorno ad alcuni Stafilinidi del Libano raccolti durante le ricerche dell'Istituto di Zoologia di Roma nel Vicino Oriente (Col. Staphylinidae). *Fragm. entom.* (in stampa).
- BORDONI A. (1985) - *Afrobium lanzai* n. sp. della Somalia (Col. Staphylinidae). *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl. **20** (in stampa).
- BREUNING S. (1939) - Novae species Cerambycidarum. VII. *Festschr. 60. E. Strand*, **5**, 144-290.
- BREUNING S. (1940) - Cerambyciden (Lamiinae) aus Somaliland. *Redia*, **26**, 213-219.
- BREUNING S. (1958) - Trois nouveaux Longicornes de Somalie (Coleoptera Cerambycidae). *Redia*, **43**, 107-109.
- BREUNING S. (1977) - Recherches sur le littoral de la Somalie. La plage et la dune de Sar Uanle. 15. Note sur les Lamiinae (Coleoptera Cerambycidae). *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **9** (13), 291-298.
- BREUNING S. (1978) - Note sur les Lamiinae de Somalie (Coleoptera Cerambycidae). *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **10** (10), 151-156.
- BREUNING S., CHELAZZI L. (1978) - Note sur les Lamiinae (Coleoptera Cerambycidae) de l'Haut Zaïre. *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **10** (12), 173-177.
- BREUNING S., VILLIERS A. (1972) - Coléoptères Cerambycidae de l'Afrique Orientale. *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **4** (11), 247-294.
- CALABRESI E. (1920a) - Un nuovo Brentide del Madagascar. *Boll. Soc. ent. ital.*, **51** [1919], 38-41.
- CALABRESI E. (1920b) - Contribuzione alla conoscenza dei Beloferini (Brentidi). *Boll. Soc. ent. ital.*, **51** [1919], 57-72.
- CALABRESI E. (1920c) - Descrizione di due nuovi Amorfocefalini (Brentidi) dell'Africa. *Boll. Soc. ent. ital.*, **52**, 64-67.
- CALABRESI E. (1920d) - Brentidi raccolti da Leonaldo Fea nell'Africa occidentale. *Annali Mus. Civ. Stor. nat. Genova*, (3) **9**, 16-45.
- CALABRESI E. (1921a) - Revisione del genere *Stratiorrhina* Pascoe (Coleopt. Brentidae). *Boll. Soc. ent. ital.*, **53**, 42-52.
- CALABRESI E. (1921b) - Nuove aggiunte alla conoscenza dei Beloferini. *Boll. Soc. ent. ital.*, **53**, 58-69.
- CASTELLINI G. (1974a) - Ricerche sul litorale della Somalia. La spiaggia e la duna di Sar Uanle. 2. Pselaphidae (Coleoptera). *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **5** (14), 183-189.
- CASTELLINI G. (1974b) - Su alcuni Pselafidi (Coleoptera) dell'Eritrea. *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **5** (17), 299-307.
- CASTELLINI G. (1983) - Ricerche sul litorale della Somalia. La spiaggia e la duna di Sar Uanle. 35. Scydmaenidae (Coleoptera). *Monitore zool. ital.*, (N.S.), **18** (7), 187-191.
- CASTELLINI G. (1984) - Notulae pselaphidologicae: II. *Redia*, **66** (in stampa).

- CASTELLINI G. (1985) - Materiali per la conoscenza degli Scidmenidi africani. *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **20** (in stampa).
- COLONNELLI E. (1979) - Ricerche sul litorale della Somalia. La spiaggia e la duna di Sar Uanle. 24. Due nuove specie di Curculionidae (Coleoptera). *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **12** (13), 247-254.
- DAMOISEAU R. (1967) - Description de quelques nouvelles espèces de Brenthidae paleotropicaux (Coleoptera: Curculionidea). *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg.*, **43** (29), 1-20.
- DECCELLE J. (1979a) - Etudes d'une collection de coléoptères Bruchides de Somalie. *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **12** (9), 79-88.
- DECCELLE J. (1979b) - Espèces nouvelles ou méconnus de Melolonthinae africains (Coleoptera Scarabaeoidea Melolonthidae). *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **12** (14), 255-271.
- DECCELLE J. (1979c) - Insects of Saudi Arabia. Coleoptera: Fam. Bruchidae (pp. 318-330). In: Wittmer W. & Büttiker W. (Editors). Fauna of Saudi Arabia. 1. Bournehall Press, Welwyn Garden City and London, VII + 372 pp.
- DESBROCHERS DES LOGES T. (1890) - Description de Curculionides et de Brenthidae inédits faisant partie des collections du Musée indien de Calcutta. *Journ. Asiat. Soc. Beng.*, **59** (32), 211-223.
- DODERO A. (1916) - Appunti coleotterologici. II. *Annali Mus. civ. Stor. nat. Genova*, **47**, 337-354.
- D'ORCHYMONT A. (1931) - Notes sur quelques *Hydraena* circum-méditerranéennes. *Bull. Soc. ent. Belg.*, **71**, 63-73.
- D'ORCHYMONT A. (1934) - Au sujet de quelques *Hydraena* italiennes. *Boll. Soc. ent. ital.*, **66** (7), 158-170.
- D'ORCHYMONT A. (1936) - Scientific results of the Vernay-Lang Kalahari expedition, March to September, 1930. Hydrophilidae. *Ann. Transv. Mus.*, **17**, 109-116.
- D'ORCHYMONT A. (1939) - *Helochares (Hydrobaticus) Andreinii* n. sp. *Redia*, **25**, 319-323.
- D'ORCHYMONT A. (1940) - Notes sur quelques *Ochthebius (Asiobates)* du groupe *bicolon*. *Boll. Soc. ent. ital.*, **72** (4), 53-61.
- FRANZ E. (1938) - Eine neue afrikanische Prionine (Ins. Col.). *Senckenbergiana*, **20**, 201-203.
- FREY G. (1961) - Neue afrikanische Coprophagen (Col.). *Ent. Arb. Mus. Georg Frey*, **12**, 511-516.
- FREY G. (1972) - Ueber einige Oniticellini und Onthophagini aus Ostafrika mit Beschreibung einer neuen Art (Coleoptera Scarabaeidae). *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **4** (13), 309-316.
- FREY G. (1976) - Einige neue Ruteliden und Sericinen aus Ostafrika (Coleoptera Scarabaeidae). *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **7**, 237-285.
- FUCHS W. (1862) - Drei neue *Balaninus*-Arten. *Berl. ent. Z.*, **6**, 423-426.
- FÜRSCH H. (1978) - Forchungen an der Somalilandküste. Am Strand und auf den Dünen bei Sar Uanle. 20. Coccinellidae (Coleoptera). *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **11** (11), 265-269.
- FÜRSCH H. (1979) - *Nephus martellii* eine neue Scymnini (Coleoptera Coccinellidae) aus Nordostafrika. *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **12** (3), 21-23.
- GAHAN C.J. (1900) - Coleoptera (partim). In: Andrew C.W. - A monograph of Christmas Island (Indian Ocean). London: XIII + 337 pp.

- GESTRO R. (1911) - Collezioni zoologiche fatte nell'Uganda dal Dr. E. Bayon. X. Nota sulle Hispidae. *Annali Mus. civ. Stor. nat. Genova*, **45**, 23-33.
- GIRARD C. (1976) - Contribution à l'étude du genre *Propsephus* Hyslop (Col. Elateridae Dicrepidinae). *Annls. Soc. ent. Fr.*, (N.S.) **12** (3), 419-431.
- GRIDELLI E. (1940) - Coleotteri dell'Africa Orientale Italiana. 11° contributo. Materiali per lo studio della Fauna Eritrea raccolti nel 1901-03 dal Dott. Alfredo Andreini. *Mem. Soc. ent. ital.*, **18** (2), 219-258.
- GYLLHENHAL L. (1840) - *Arrhenodes forcipitigerus*. In: Schoenherr C.J. - Genera et species Curculionidum cum synonymia hujus familiae. Roret, Paris, 5 (parte 2), pp. VIII+465-970.
- HELLER K.M. (1920) - Ein neue, im Neste der Kammratte (*Ctenomys*) lebender Rüsselkäfer aus Argentinien. *Ent. Bl. Biol. Syst. Käfer*, **16**, 239-240.
- HOLDHAUS K. (1924) - Monographie du genre *Reicheia* Saulcy (Coleoptera Carabidae). *Abeille, Paris*, **32**, 161-220.
- HUSTACHE A. (1938) - Spedizione del Prof. N. Beccari nella Guiana inglese (1931-32). Curculionidae. *Mem. Soc. ent. ital.*, **17** (1), 39-43.
- JEANNEL R. (1937) - Les Bembidiides endogés (Col. Carabidae). Monographie d'une lignée gondwanienne. *Revue fr. Ent.*, **3**, 241-396.
- JORDAN K. (1929) - A new Anthribid (Coleopt.) from Italian Somaliland. *Boll. Soc. ent. ital.*, **61** (10), 165-166.
- KASZAB Z. (1973) - Beiträge zur Kenntnis der Meloiden (Coleoptera) aus Ostafrika. *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **5** (5), 43-59.
- KERREMANS C. (1899) - Buprestides de l'Afrique équatoriale et de Madagascar. *Annls. Soc. ent. Belg.*, **1899**, 256-298.
- KERREMANS C. (1906) - Materiali per lo studio della fauna eritrea raccolti nel 1901-03 dal Dr. A. Andreini tenente medico. *Boll. Soc. ent. ital.*, **38**, 91-104.
- KLEINE R. (1921) - Die Gattung *Orychodes* Pascoe und ihr Verwandtschaftskreis. *Arch. Naturgesch.*, **86** [1920] A (9), 62-102.
- KORSCHESKY R. (1940) - Über Coccinelliden von Erythraea. *Redia*, **26**, 71-72.
- KREKISCH-STRASSOLDO G.B. (1928) - Il *Formicomus canaliculatus* Laf. e specie affini d'Africa. *Annali Mus. civ. Stor. Nat. Genova*, **52** [1925-28], 383-386.
- LEO P. (1982) - Gli *Pseudoseriscus* italiani del gruppo *Helvolus* (Küster) (Coleoptera Tenebrionidae). *Natura*, Milano, **73** (1-2), 97-107.
- LEO P., PISANO P. (1978) - Tassonomia, geonomia ed ecologia delle razze di *Pimelia angusticollis* Sol. e descrizione di una nuova sottospecie (Coleoptera Tenebrionidae). *Atti Congr. naz. ital. Ent.*, **11**, 79-83.
- MACHULKA V. (1923) - De novis faunae bohemicae Coleopteris. *Sb. ent. Odd. nàr. Mus. Praze*, **9**, 70-71.
- MACHULKA V. (1930) - Eine synonymischer Studie ueber *Euplectus bescidicus*. *Ent. Nachr. Bl.*, **4**, 44-45.
- MACHULKA V. (1931) - Nove druhy Cephennii zo Slovenska a Podkarpatskej Rusi. *Sb. prír. Odb. Slov. Vlastiv. Muz. Bratislave*, **1931**, 59 e sgg.
- MAGRINI P., VANNI S. (1984a) - *Duvalius degiovannii*, n. sp. e *Duvalius bianchii mingazzinii*, n. ssp. dell'Appennino Tosco-Romagnolo (Coleoptera Carabidae). *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem.*, (B) **91** (in stampa).

- MAGRINI P., VANNI S. (1984b) - Una nuova sottospecie di *Duvalius jureceki* (Dodero, 1917) dell'Appennino Tosco-Emiliano: *D. j. maginianus* (Coleoptera Carabidae). *Sottoterra*, Bologna, (in stampa).
- MAGRINI P., VANNI S. (1984c) - Note su alcuni *Duvalius* dell'Appennino centrale, con descrizione di una nuova specie (Coleoptera Carabidae). *Boll. Notiz. Sez. fior. Club alp. ital.*, **1984** (4), 9-12.
- MAGRINI P., VANNI S. (1984d) - Brevi considerazioni sul *Duvalius malavoltii* Moscardini, 1956 e descrizione del *Duvalius malavoltii busii* ssp. n. della Grotta di Lavacchio (Modena) (Coleoptera Carabidae). *Sottoterra*, Bologna, **23** (67), 28-31.
- MARSHALL G. (1939) - Curculionidae (Col.) collected in Northern Rhodesia by Professor L. Cipriani. *Redia*, **25**, 289-302.
- MÜLLER G. (1938) - Raccolte entomologiche del Dr. Alfredo Andreini in Eritrea. Histeridae (Coleoptera). *Boll. Soc. ent. ital.*, **70** (9-10), 165-175.
- OBENBERGER J. (1913) - Bemerkungen über einige neue und einige bekannte Buprestiden Arten. *Koleopt. Rdsch.*, **2**, 25-33.
- OBENBERGER J. (1917) - Studien über paläarktische Buprestiden. II Teil. *Wien. ent. Ztg.*, **36**, 209-218.
- OBENBERGER J. (1924a) - Kritische Studien über die Buprestiden (Col.). *Arch. Naturgesch.*, **90** (3), 1-171.
- OBENBERGER J. (1924b) - Revision monographique du genre *Taphrocerus* Solier (Col. Buprestidae). *Sb. ent. Odd. Nár. Mus. Praze*, **2**, 45-83.
- OBENBERGER J. (1928) - Opuscula Buprestologica I. Beiträge zur Kenntnis der Buprestiden (Col.). *Arch. Naturgesch.*, **92** [1926] (9-11), 1-350.
- OBENBERGER J. (1932) - Neue Beiträge zur Kenntnis der orientalischen Prachtkäfer. Col. Bupr. *Folia Zool. Hydrobiol.*, **4** (2), 205-220.
- OBENBERGER J. (1933) - Sur quelques espèces intéressantes de la famille des Buprestides de la République Tchécoslovaque. *Cas. české Spol. ent.*, Praha, **30**, 173-180.
- OBENBERGER J. (1933a) - *Agrilus*-Studien. II. (Col. Buprestidae). *Wien. ent. Ztg.*, **50**, 6-24.
- OBENBERGER J. (1933b) - De *Agrili generis speciebus novis* (Col. Bupr.). *Sb. ent. Odd. nár. Nus. Praze*, **11**, 15-81.
- OBENBERGER J. (1934) - Studien über Palaearktischen Buprestiden. I. *Folia Zool. Hydrobiol.*, **5**, 158-290.
- OBENBERGER J. (1935) - Sur les espèces des Buprestides, trouvées en 1934-1935 en Afrique Centrale par M.B. Machulka (Col. Bupr.). *Sb. ent. Odd. nár. Mus. Praze*, **13**, 98-100.
- OBENBERGER J. (1936) - Festarbeit zum sechzigjährigen Jubiläum meines Freundes Univ. Prof. Dr. Emlrik Strand. *Fest.-Schr. 60. geburstag E. Strand*, **1**, 97-145.
- OBENBERGER J. (1938) - Études sur les espèces du genre *Anthaxia* Eschsch. (Col. Bupr.). *Sb. nár. Mus. Praze*, **1** (B), 171-249.
- OBENBERGER J. (1940) - Ad regionis palaearcticae Buprestidarum cognitionem additamenta. *Sb. nár. Mus. Praze*, **2** (B), 111-189.
- OBENBERGER J. (1942) - De novis generis *Polybothris* speciebus et formis. *Sb. ent. Odd. nár. Mus. Praze*, **20**, 30-49.
- OHAUS F. (1939) - Verzeichnis der von Herrn Dr. A. Andreini, Prof. Dr. Stefanini und Prof. Dr. Puccioni, F. Bigi und E. Faà di Bruno in italienisch Ostafrika gesammelten Rutilinen (Coleopt. Scarabeidae). *Boll. Soc. ent. ital.*, **71** (1), 27-28.

- PACE R. (1977) - Stafilinidi endogei dei Monti dell'Uccellina (Toscana) (Coleoptera). *Animalia*, **5**, 171-186.
- PACE R. (1979) - *Mesotyphlus* d'Italia (Coleoptera Staphylinidae). *Redia*, **62**, 95-106.
- PECCHIOLI M. (1837) - Description de deux Coléoptères nouveaux d'Italie. *Ann. Soc. ent. Fr.*, **1837**, 445-447.
- PEDERZANI F., ROCCHI S. (1982) - Dytiscidae (Coleoptera) collected in the People's Republic of Congo by Mr. Giovanni Onore in the years 1977-1980. *Redia*, **65**, 65-88.
- PIC M. (1928a) - Missione Scientifica Stefanini-Paoli nella Somalia Italiana meridionale 1913. Liste de Coléoptères de la Somalie avec description de nouvelles espèces. *Mem. Soc. ent. ital.*, **6** (1) [1927], 21-25.
- PIC M. (1928b) - Liste de Coléoptères de la Somalie avec descriptions de nouvelles espèces. *Mem. Soc. ent. ital.*, **6** (1) [1927], 37-43.
- PIC M. (1933) - Materiali per lo studio della fauna eritrea raccolti nel 1901-1903 dal Dr. A. Andreini. Coléoptères. *Boll. Soc. ent. ital.*, **65** (6), 119-130.
- PICCIOLI F. (1870) - Descrizione di due nuove specie di Coleotteri italiani. *Boll. Soc. ent. ital.*, **2**, 306-314.
- PICCIOLI F. (1877) - Nuovo coleottero italiano della famiglia degli Antribidi. *Boll. Soc. ent. ital.*, **9**, 214-216.
- PITTINO R. (1984) - Taxonomic considerations on, types revisions, lectotype designation and description of new or little known Psammodiini from Palaearctic, Oriental and Ethiopian Regions (Coleoptera Aphodiidae) (XXVI Contribution to the knowledge of Coleoptera Scarabaeoidea). *G. Ital. Ent.*, **2** (6), 13-98.
- PUTHZ V. (1970) - Zwei neue *Stenus*-Arten aus Italien nebst einer synonymischen Bemerkung (Coleoptera, Staphylinidae). *Annali Mus. civ. Stor. nat. Genova*, **78**, 52-58.
- RÉGIMBART M. (1904) - Escursioni del Dott. Achille Tellini nell'Eritrea, Ottobre 1902-Febbraio 1903. Udine, Tipografia A. Tellini, 4 pp.
- RÉGIMBART M. (1905) - Materiali per lo studio della fauna eritrea raccolti nel 1901-03 dal Dr. A. Andreini (Tenente medico). II. Dytiscidae, Gyrinidae et Hydrophilidae. *Boll. Soc. ent. ital.*, **36** [1904], 201-226.
- REICHENSPERGER A. (1953) - Ueber einen neuen *Paussus* (subg. *Katapaussus* Wasm.) und ihm verwandte Arten. *Annali Mus. civ. Stor. nat. Genova*, **66**, 161-165.
- ROCCHI S. (1975) - Nota sistematica sul *Potamonectes tellinii* (Régimbart, 1904) (Coleoptera Dytiscidae). *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **6** (14), 269-274.
- ROCCHI S. (1976) - Coleotteri Ditiscidi dell'Oasi di Galgala (Somalia) con descrizione di una nuova specie di *Prodaticus*. *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **8** (11), 287-293.
- ROCCHI S. (1979) - Descrizione di due nuove specie di Ditiscidi africani (Coleoptera, Dytiscidae). *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **12** (5), 33-38.
- ROCCHI S. (1981) - Ditiscidi del Portogallo con descrizione di una nuova specie di *Hydroporus* (Coleoptera, Dytiscidae). (X Nota sui Coleotteri Idroadefagi). *Boll. Soc. ent. ital.*, **113** (8-10), 149-153.
- SCHATZMAYR A., KOCH C. (1934) - Due nuovi *Glyptomerus* delle Alpi Apuane (Col. Staph.). *Boll. Soc. ent. ital.*, **66** (10), 259-266.
- SENNA A. (1889a) - Contribuzioni allo studio dei Brentidi. I. Note sul *Cephalobarus macrocephalus* Dej. *Boll. Soc. ent. ital.*, **21**, 33-38.

- SENNA A. (1889b) - Contribuzioni allo studio dei Brentidi. IV. Note diverse. *Boll. Soc. ent. ital.*, **21**, 101-109.
- SENNA A. (1891) - Contributions to the knowledge of the family Brentidae. VI. *Notes Leyden Mus.*, **13**, 161-166.
- SENNA A. (1892a) - Contributions to the knowledge of the family Brentidae. VIII. Enumeration of the species known as yet from Java. *Notes Leyden Mus.*, **14**, 161-186.
- SENNA A. (1892b) - Contribuzione allo studio dei Brentidi. Nota X. *Boll. Soc. ent. ital.*, **24**, 26-37.
- SENNA A. (1892c) - Contribuzione allo studio dei Brentidi. Nota XII. *Boll. Soc. ent. ital.*, **24**, 152-163.
- SENNA A. (1892d) - Contribuzione allo studio dei Brentidi. Nota XIII. *Boll. Soc. ent. ital.*, **24**, 253-256.
- SENNA A. (1892e) - Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regioni vicine. XLV. Brentidi. *Annali Mus. civ. Stor. nat. Genova*, (2) **12**, 429-494.
- SENNA A. (1893a) - Contribuzione allo studio dei Brentidi. Nota XVI. Brentidi raccolti nell'Isola di Engano dal Dott. Elio Modigliani. *Annali Mus. civ. Stor. nat. Genova*, (2) **13**, 256-284.
- SENNA A. (1893b) - Contribuzioni allo studio dei Brentidi. Nota XVII. *Boll. Soc. ent. ital.*, **25**, 117-135.
- SENNA A. (1893c) - Contribuzioni allo studio dei Brentidi. Nota XXII. Su alcuni Brentidi importati col tabacco secco di Sumatra. *Boll. Soc. ent. ital.*, **25**, 288-336.
- SENNA A. (1894a) - Viaggio di Lamberto Loria nella Papuasia Orientale. XIV. Brentidi. *Annali Mus. civ. Stor. nat. Genova*, (2) **14**, 554-564.
- SENNA A. (1894b) - On some new Brentidae from Java and Sumatra. *Notes Leyden Mus.*, **16**, 179-196.
- SENNA A. (1894c) - Contribution à l'étude des Brenthides. *Annls Soc. ent. Belg.*, **38**, 357-383.
- SENNA A. (1894d) - Insectes du Bengale. Brenthides recueillis par le R.P. Cardon. *Annls Soc. ent. Belg.*, **38**, 384-386.
- SENNA A. (1894e) - Révision des espèces du genre *Raphirhynchus*. *Annls Soc. ent. Belg.*, **38**, 590-611.
- SENNA A. (1895a) - Description of some new Brentidae. *Notes Leyden Mus.*, **16**, 213-226.
- SENNA A. (1895b) - Sur quelques espèces de *Miolispa*, Pasc., du Musée Royal de Belgique, du Musée Rothschild à Tring, et de ma collection. *Annl Soc. ent. Belg.*, **39**, 358-367.
- SENNA A. (1896a) - Révision des espèces du genre *Ulocerus* Dalman. *Annls Soc. ent. Belg.*, **40**, 190-223.
- SENNA A. (1896b) - Description of two new Brentidae. *Notes Leyden Mus.*, **17**, 57-62.
- SENNA A. (1896c) - On the genus *Cerobates* Schh. and description of some new species. *Notes Leyden Mus.*, **17**, 209-224.
- SENNA A. (1897a) - Description de quelques espèces nouvelles de Brentidae du Musée Royal de Belgique et de ma collection et notes diverses. *Annls Soc. ent. Belg.*, **41**, 227-236.
- SENNA A. (1897b) - Sur quelques espèces de Brentidae de Célèbes recueillies par M.H. Fruhstorfer. *Annls Soc. ent. Belg.*, **41**, 237-243.

- SENNA A. (1898a) - On some Brenthidae collected by Mr. J.D. Pasteur in Java. *Notes Leyden Mus.*, **20**, 51-62.
- SENNA A. (1898b) - On a new genus and several new species of Brenthidae. *Notes Leyden Mus.*, **20**, 65-76.
- SENNA A. (1898c) - Additions à la faune brenthidologique du Kamerun. *Dt. ent. Z.*, **1898**, 369-377.
- SENNA A. (1902a) - Brentidi delle regioni dei Batacchi indipendenti (Sumatra). *Boll. Soc. ent. ital.*, **34**, 152-178.
- SENNA A. (1902b) - Coleoptera: Rhynchophora, Brenthidae (pp. 279-281). In: Shelford R.A. - Observations on some Mimetic insects and spiders from Borneo and Singapore. *Proc. zool. Soc. London*, **1902** (2).
- SENNA A. (1909) - Note sulle specie di *Diurus* e descrizione del nuovo genere *Eterodiurus*. *Boll. Soc. ent. ital.*, **41**, 28-53.
- SENNA A. (1918) - Nuove specie di *Cordus* Schh. *Boll. Soc. ent. ital.*, **50**, 78-85.
- SHARP D. (1895) - Brenthidae (pp. 1-80). In: Godman F.D. & Salvin O. - *Biologia Centrali-Americana*, **4** (parte 6).
- SPAETH F. (1933) - Una nuova *Cassida* dell'Eritrea. *Boll. Soc. ent. ital.*, **65** (2), 48.
- STRANEO S.L. (1941) - Sulla distribuzione e la variabilità del *Percus dejani* Dej. (Coleopt. Carabid.). *Boll. Soc. ent. ital.*, **73** (1), 15-18.
- STRANEO S.L. (1943a) - Un nuovo *Duvalius* italiano. *Atti Soc. ital. Sci. nat.*, **82** (1), 10-11.
- STRANEO S.L. (1943b) - Elenco dei Carabidi raccolti in Eritrea dal Colonnello Dr. A. Andreini negli anni 1900-1903. *Mem. Soc. ent. ital.*, **22**, 89-101.
- VANNI S., LANZA B. (1983) - *Duvalius magrinii*, n. sp. dell'Appennino Toscano (Coleoptera Carabidae). *Redia*, **66**, 335-342.
- VILLIERS A. (1972) - Vedi BREUNING S., VILLIERS A. (1972).
- WAGNER H. (1910) - Neue Apioniden. *Soc. ent. Steglitz*, **24**, 153-155.
- WEISE J. (1922) - Ueber Coccinelliden aus Amani (Col.). *Ent. Mitt.*, **11** (3), 105-106.
- WITTMER W. (1978) - Forschungen an der Somalilandküste. Am Strand und auf den Dünen bei Sar Uanle. 18. Malachidae (Coleoptera). *Monitore zool. ital.*, (N.S.) Suppl., **11** (3), 99-102.

(ms. pres. il 3 agosto 1984; ult. bozze il 18 gennaio 1985)