

GIULIO FERRETTI, MARCO CANINO, DANIELE VICIANI

IL MANOSCRITTO “*CATALOGO DI PIANTE ALPINE
COLLE PRECISE LORO LOCALITÀ*” DI GIOVANNI GIANNINI,
BOTANICO TOSCANO DEL XIX SECOLO: TRASCRIZIONE,
AGGIORNAMENTO NOMENCLATURALE E INDAGINE D’ERBARIO
SU ALCUNE PIANTE CRITICHE O DI INTERESSE FITOGEOGRAFICO

SUPPLEMENTO A:

Il manoscritto “*Catalogo di piante alpine colle precise loro località*”
di Giovanni Giannini. Copie fotostatiche

Catálogo di piante alpine

colle precise loro località



Acer Opalus Sav. Nell'appenino a Ivrea,
ed al brato fiorito. Nell'appenino Piemontese
se all'Abetone, ed a Cimbalbo nel
Modenese. L'*acer longepetio* non
l'ho trovato più alto di Brocchi, bratofante.

Arctium Lycopodium L. del solo Pisanino.

Actaea Spicata L. Trovata in Valodina.

Podostemum alpinum Nest. Brato Fiorito, e dice
ho la Foce a Tobbio a Sestriere - Panca
te, e più in alto regione del Faggio in luoghi
umidi. Bratofante rara.

Poa monochatallina L. Copiosa in luoghi
suffocati al solo di Biagio.



Regozodium podagraria L. oltre la pianura
l'ho raccolta col Sign. Dr. Pietro Savi nei
figliativi presso la Chiesa di S. Pellegrino.

Agrostis rugosifolia All. Biaglia di Coreglia a piè
del Mammellone del Gardinajo nei luoghi
essosi, Mond. B. Potenza, fraimento luogo
verso sopra la Spadaleto, e nell'Agami-
no modenese al Monte Cimone.

Aira caespitosa L. Nei luoghi umidi della
Musceta, della Gora a Gogo, e della
parte settentrionale della Gora per an-
dare alle B. Potenza, e nella lamina
sotto la Croce Stepa, ma in questi
luoghi si trova mangiata dai cavalli
e dalle pecore.

Crifata L. Coziofiggino al Prato fiorito.

Alexuosa L. Musceta, Prato fiorito etc.

Alchemilla alpina L. Nel Mt. Gardinajo cozio-
figgino nelle alte selve di faggio sopra la Gora a
Gobbio, ed in alto luogo il solo di Biagio.

Allium fallax Gou. Nel Gardinajo non tanto co-
mune, Al Passetto di Coreglia piccola

soce con pagina via per andare al Lago-
Maccio, luoghi secchi ed essosi dell'age
di Coreglia alla scorticchiaglia e più co-
mune. L'ho trovato sempre fra i Hardy Stritali.

Allium Schoenogonum Bert. Nel Pisanino

della alpi apuane

Sphaerocephalon L. Coziofiggino al Pra-
to fiorito nei luoghi sassosi.

Scorolans Willd. Nei luoghi sassosi
del Gardinajo, e nelle alte selve di fag-
gio sopra la Gora a Gobbio.

Uspinum L. L'ho trovato solamente a
S. Pellegrino nelle selve dei faggi.

Astragalus incana DC. Coziofiggino nei prati
aperti a Coziofiggiano nel Minuccianese.

Archiza Barbelieri Gou. Non ho trovato que-
sta specie più in alto della Musceta.

Coziofiggino nei coltivati a Coreglia.

Arenaria Hegatica L. Bruglio, Prato fiorito etc.

Artemone alpina B. Best. Nel Gordinajo, e a
A. Frati non comune. Comunitissima nei
prati della muscata, di Misera Ciancia
e delle caji dette Prata di Montepesatope
le quali confinano colla Muscata, e giu-
so lo Spedaletto. Quasi al Prato fiorito, e
forse ora non vi si trova più.

— *saxiflora* L. L'ho raccolta solamente
al Gordinajo, nei dirupi, e sopra i roccia-
li, che confinano col mazzumellone del
Gordinajo.

— *saxiflora* L. Negli erosi di Prato
fiorito, di Palodina sopra degli Aquani,
e nelle Prata di Pappaglia.

Artemone austriaca Best. L'ho trovata sui
vecchi muri di Montepesatope.

Artemone libano L. Prato fiorito, muscata
ed in Pania alpe Aquana.

Artemone austriaca L. Lungo il Solco di
Riagio assai comune. Cospice al Pian di Pa-
reta sopra lo Spedaletto, ma in luogo cir-
cospetto, ed al Papanica alpe Aquana.

Artemone austriaca Best. Gordinajo, A. Frati, Prato.

Aquilegia alpina L. al Monte Gordinajo comune.

— *pyrenaica* Best. Nel monte Pania l'ho
trovata rara; cospice alla Tambura.

Artemone alpina L. Nell'Appennino Lucchese
da me percorso non ho trovato questa
specie al di sopra dello Spedaletto.

— *aurata* Best. Lungo il torrente Felajo,
e al Saffone appena di Casoglio sopra
Pracchi sopra del Faggio.

Artemone liniflora Best. L'ho raccolta nei
luoghi alti della Tambura presso la
foce ove trovasi la via per Massa.

— *rubra* L. Foce a Gobbio sopra i faggi.

Arenaria verna Bert. al vaso mammellone
del Fondinajo, e Monte Cimone vicino
di Modena.

Tristilochia pallida Walst. Copiosa all'Alba-
reta sopra Montefegatone, e meno copiosa
al Brato fiorito.

Arnica Bellidifera Willd. In tutta l'Appen-
nino Lucchese. Copiosissima al Brato fiorito.

Antennaria Mutellina Bertol. L'ho trovata
sempre nell'altissimo Fondinajo fra i sassi
in luogo molto circonfitto, e quasi imprate-
cabile. Per il Lucchese è pianta rara.

Antitida Bertol. L'ho trovata copiosa nel
monte Pania sopra Apraua.

Arnica Speciosa Bert. S. Pellegrino.

Arnica montana Bert. Spedalotto, Calda-
tella Grotta appennino di Casoglio regione
del Goggio, e copiosissima alla Gocca a
Lugo fra i faggi tagliati.

Alarum europaeum L. In Pracchi, e alla
Resnacca di Montefegatone in un bosco
di avellani, ove è assai copioso.

Alparagium tenuifolium Lam. Nei prati di Bal-
dina, nel Brato di Casaglia, Brato fiorito, cf.

Algarula cynanchica L. Nelle fessure dei
sassi in Fondinajo, ma piuttosto rara.

Adiantum L. fra i faggi al Mascatello, e
in luoghi umidi, e ombrosi sopra Cardo-
pao Baldina.

Alphodelus albus Willd. In diversi luoghi dell'
appennino Lucchese, ma copiosissimo sopra
nella Mijeta, e Brato di Montefegatone,
verso la parte di Spedalotto.

Altes alpinus L. Fondinajo, e S. Bottezza.

Astragalus degregatus L. allo Spedalotto, e prin-
cipalmente al Colle della Pietra fra i sassi,

Avena ancora al Prato fiorito fra i calaveri,
ma più raro, e più piccolo.

Astragalus monogynus Best. Prato fiorito.

— *gurgureus* Lam. Prato fiorito, e Misera
Ciancia presso Spedaletto.

Aphantia pauciflora Bertol. Nel Sifanino, e
nella estrema Dania, ove è copiosa.

Amanita Libanotis L. Prato fiorito, e Mi-
sera Ciancia presso Spedaletto.

Astroga belladonna K. Nelle selve all'
Abetone. Nelle selve ultime di Casta-
gni fra Cardopo, e Paladina; ove è assai
copiosa; ed una sol volta l'ho trovata
nell'atreo del torrente Fegana alla
Polla di Pinotto sotto Montefegatessa.

Avena flavescens K. L'ho trovata al
Prato fiorito, ed una sol volta a Pa-
reglio sotto il paese.

Avena pratensis Mart. Si trova assai co-
piosa allo Spedaletto, ed in minor copia
al Pian di Corsetta, e trovasi ancora al
Prato fiorito.

— *rubescens* L. In una vallata del Fondinajo
sotto la Stradella che attraversa il Mammellone
versante meridionale, ed in poca quantità
trovasi pure al Prato fiorito.

Asterica hirsuta L. Questa specie l'ho tro-
vata solamente a' S. Prati in un luogo
assai circoscritto sopra la Stradella che at-
traversa l'località versante meridionale.

Betula alba L. al Prato fiorito, e nei boschi
di Foce Cavalajo principio della regione
del faggio.

Bifuntella laevigata L. St. Petradese sopra
la Spedaletto termine della regione del fag-
gio, sopra il Bagacciolo più raro in Fondinajo.

Brassica cheiranthus Willd. Lungo il Solco di

Biagio, ed in un luogo assai circoscritto al
Piano di Sorvata.

Trifolium olivaceum L. Su Zaccoloni lungo il ter-
rente Pelago sopra il Ponte a Gagliu ultima
regione del Castagno in luoghi calcarei, e ora
non possono praticare le casse. Più in alto
nei dirupi al Grotto di Santone, e più
copioso nell'Orto del Diavolo in luoghi
calcarei, ma molto rigidi. Conspicuo i Bot-
toni a non percorrere quei luoghi, ma
mandarci pastori dei Paesche abitano la
stata in quei monti coi bestiami.

Briza media L. Copiosa nella Musceta, e
Prato Fiorito.

Bromus erectus Best. Nel Giardino.

Brizidium bulbocarpum L. Prato il Castello
di Montefegatone, al Prato Fiorito, ove è
copioso, ed allo Spedaleto lungo la
via notabile vicino il Carbone Tomai.

Brylansia aristata DC. Non ho trovato que-
sta ombrellata più in alto di Pracchi.

— *graminifolium* Vahl. al Prato Fiorito, ove
è comunissimo, e negli erbaggi ai 24. Frate.

Brylthalmum flexile Best. Copioso al mon-
te fiorito, ed una sol volta l'ho trovato
in una selva fra i castagni lungo la via
modenese l.º d.º a Marzagola vicino al
Sajo de' Mattoni.

Cattha palustris L. Nel Giardino versante occi-
dentale ov'è un gemito di acqua, copio-
so poi sotto la Foe a Prato versante me-
ridionale lungo i rigagnoli.

Campanula glomerata L. Copiosa al Prato
Fiorito, e nelle Prata di Montefegatone.

— *persicifolia* L. Copiosa lungo il Sajo di Biagio.

— *rotundifolia* L. Nel Giardino, 3. Botan-
ge, Prata di Montefegatone, e Prato Fiorito.

Cariciumula bicata L. Nella sponda orientale del lago di Biagio, o sia è assai copioso, trovasi pure nei disegni di Helvetense sopra la via modenese nella sponda orientale del lago della mactinella. Qui si raccoglie con difficoltà. Rarissima la regione del faggio.

Cardamine amara L. Nei luoghi umidi vicino allago-Baccio territorio modenese, ma erba, ossia gajolo, kucchose.

— *apsitifolia* L. Copiosa lungo una sorgente d'acqua al Mercatello, e dietro la Gioia a Lobbio a ponente, e in alto, ma nella regione del faggio.

— *refedifolia* L. Pian di Rossata sopra la Spedaletto, e Lago Baccio.

— *thalictroides* Willd. Nelle selve de' faggi allo Spedaletto.

Carduus cartinasifolius DC. Nei luoghi alti dell'aggenino. Giardino, B. Potenze,

Poggio. all'acqua luogo scoperto dell'aggenino di Controne, Gioia o Lago fra i faggi tagliati a carbone ed.

Carex cincta Best. Pajoli di Lago Baccio. — *peruviana* Steud. Pajoli del fordinajo sotto il mammellone versante meridionale, e Brato Fiorito.

— *frigida* All. Luoghi umidi nelle vallate di Potri.

— *macrolepis* DC. Sopra Montefogate se, Brato Fiorito, e pajoli del fordinajo

numerata all. Copiosa si trova al Procinto delle Alpi Aquane.

— *pedersifolia* Copiosa a S. Pellegrino.

— *Ovalis* God. Spedaletto, mercatello, ed estremamente copiosa in Campagna di Controne in un coltivato inteso, ed ora abbandonato.

Carex gallicana L. Comune nei prati della
Majcata sotto lo Spedalotto.

Castanea aculeata L. Comune in tutto l'Agro.

Caryophyllus betule L. Nei boschetti in Pracchi,
chi, Montefegatose etc. comune.

Caulis daucoides L. Copioso in Pracchi,
e mai l'ho trovato sopra questa al-
taggia.

Centauria montana L. Copiosa al prato
fiorito, nella Majcata, in mandria, ed
ai suoi confini Misera Ciancia, Prato
di Montefegatose, e Spedalotto.

nerosa Bert. Ho trovato questa
specie solamente a S. Pellegrino,
ove è copiosa in quasi prati.

periclyptera B. West. A' 4 Prati, e Fond.

phrygia Bert. Nella Majcata comune.

Chenopodium boru Henricus L. Copiosis-
simo alla Foce a Giovo a S. Nicotro, ed a
Settentrone.

polygammum L. nasce in copia nei
campi d' Albereta sopra Montefegatose.

Chrysanthemum atratum L. Prato fiorito,
alle Prata di Montefegatose, Spedalot-
to e Belvedere.

Chrysosplenium alternifolium L. Ho trovato
questa specie soltanto nella Lanaccia
sotto la Foce a Giovo verso Setten-
trionale, e nella Comuna lungo i
rigagnoli.

Cineraria longifolia Willd. Paladina e Prato fiorito.

Cirsium alpina L. L'ho raccolta sotto la
Lanaccia in una selva di faggi, e a S.
Pellegrino.

Clematis recta L. Questa specie l'ho
raccolta a Gorfogliano lungo un rio, e
mai altrove.

Erigeron acutifolius Willd. Foce a Lago sopra
Montefegatese, presso il Brato fiorito,
ed alla Foce a Lago.

— *Erigeron* Best. Nella Brata di Mon-
tefegatese, Spedaletto. L'ho trovato an-
cora in una selva di Bartigliano sul
torrente Padogna, e mai in altri luo-
ghi così bassi.

— *B. Best.* Nella Musceta a poca
distanza dallo Spedaletto.

— *erigitholus* Best. Nei luoghi esposti
dalla Musceta.

— *ferox* All. Lamaccia, e Spedaletto.

— *horridus* Best. L'ho raccolto soltanto
sulla Tambura alpe Aquana.

Cochlearia saxatilis Lamk. Nella Bassa
alpe Aquana.

Colchicum montanum All. Comune nei prati
della Musceta.

— *autumnale* L. Musceta.

Convallaria majalis L. Nel Bifanino comune.

— *multiflora* L. Nei prati della Musceta.

— *Polygonatum* L. Nella Musceta, so-
pra l'Albereta, ed al Brato fiorito.

— *vesticillata*. Comunque al Bifani-
no alpe Aquana, rara sopra il Brato
a settentrione, e non sempre fiorisce,
ed una sol volta ne ho trovato tre
esemplari nella Musceta.

Corrigiola litorealis L. Questa specie, per
me rara, una sol volta l'ho trovata
sotto Pesoglio lungo la Fagana, ed un
altra volta a Valdottavo lungo la via co-
munale s. d. al Cuoco.

Corydalis adunca DC. Tra i sassi nella Cal-
de del Fondinajo. Specie rara.

— *ochroleuca* Bast. Nell'agguamo di Gese-
glio al Saffore, regione del faggio, e non
l'ho trovata mai al di sopra di questa altezza.
nei luoghi da me percorsi dell'agguamo Luc.

— *tuberosa* DC. Questa specie l'ho
trovata soltanto in due circoscritte
località: nei luoghi ombrosi al solco
di Biagio, e al Mercatello, ma qui
più rara.

Crataegus Aria L. Nell'agguamo di Mor-
tefegatese alla Gaja, ed in Palodina
ove sono più grossi che altrove.

Cynanchid. vincetoxicum Pers. In tutto l'agguamo.

Daphne genkwa Martol. Nel monte Pania.

— *Meyeri* L. Lungo il Solco di Bia-
gio assai comune.

Dactylis bulbifera L. Copiosa lungo il Solco
di Biagio, Prato fronto. etc.

— *gemma* Willd. Nella Mafetta, nella
Cassa della Grotta regione del faggio, e
lungo il Solco di Biagio. Non è molto co-
mune.

Dianthus Aemula L. È assai comune a
Foce Cavallojo regione del faggio.

— *coryophyllus* L. Trovato in bella copia
sul Monte Fondinajo.

— *monopetalus* L. Bianca di Carretta, Spe-
dalotto, Prato fronto, 3. Botanze, etc.

Doronicum aegyptiacum Bast. Nel agguamo
Poggio alla Bianca del Poggio.

— *Columnae* Ten. Nei calcarei di Botu-
ove è comune, raro nel Fondinajo, e
nel Monte Binore.

Doronicum vernaliancheif Host. L'ho raccolto nel maso del Ponte di Calavorno sul Serchio, e nell'agosto Modenese a Doccia presso il Cimone.

Dryas aizoides L. *Corymbosa*. nasce in Fondinajo. Una sol volta l'ho trovata nell'alta regione più alta del faggio sopra lo Spedaletto, in un muro a secco.

Dryas octopetala L. *Corymbosa* si trova nell'alta Pania.

Empetrum nigrum L. Nei monti più elevati come Fondinajo, B. Batezza etc.

Erythronium affine-fabianum Will. Abetone. Cresce la Face a Fobbio e vizagnoli.

angustifolium L. Spedaletto ma piuttosto raro.

angustissimum Willd. Nei Monti mai trovato al di sopra del Configno.

Erigeron acris L. Face a Fobbio; Biano del Lago; Belvedere.

alpinum L. Belvedere, Fondinajo, B. Batezza.

Eriophorum angustifolium Willd. al di là di S. Pellegrino al Biano da Lagotti in prati umidi.

capitatum Host. Cresce sulla sponda dove io l'ho trovata nel solo Lago Baccio alla Sparda umida.

pubescens Host. Nei prati umidi della montagna.

Erysimum albium L. In agosto di Monte Fegolese alla Braja regione del faggio dove è comune.

concoloratum G. Br. Spedaletto, Brato Fiorito, e a Mareggio; ma più basso non l'ho mai trovato.

Euphorbia dulcis L. comune al Brato fiorito.

— *purpurata* Thuill. Brato fiorito.

Euphorbia officinalis L. Copiosa nel Fondinajo.

— — A Coll. Questa varietà è ho-
sticata nelle nude di Bojo all'Acqua, ed
in minor copia alle Tre Potenze.

Festuca Asculago L. Nei coltivati di Calleg-
gio, e ogni comune al Brato fiorito.

Festuca calamaria Bert. del Appennino
di Controne.

— *Halleri* Bert. Nei Pradoni di Ta-
reglio regione del faggio.

— *heterophylla* Bert. Fondinajo.

— *poaeformis* Bert. Fond., e S. Potenze.

— *spadicea* L. Brato fiorito. In un ma-
to vicino allo Spedaletto, Fondinajo,
e copiosissima nei luoghi scoperti fra
il Fondinajo, e la Scorticchiaja al pe-

di Coreglia.

Galanthus nivalis L. Non ho mai trovato
questa specie più alta di Luccatoni pres-
so il torrente Palajo.

Galium cruciatum Bert. Nella Muscata.

— *arctum* Andr. Su Fondinajo.

— *mollugo* nei Pradoni di Tareglia fra i faggi.

— *pusillum* L. Fondinajo.

— *pyrenaicum* L. Copiosissimo nella Pania.

— *rotundifolium* L. Lungo il torrente
Palajo in Botri, e presso il Lago Baccio.

— *subrum* L. Fondinajo, e comunissimo
lungo la strada che da Giunvalbo conde-
ce al Monte Cimone.

Gentiana scabra L. Brato fiorito, nella
Muscata, e prata di Montefegatelo
comunissima.

— *campestris* L. Muscata, Brato fiorito.

- Fond: Tre botenze, Lago Nero etc.
- Gentiana ciliata* L. alla Gropa, Prato di Montefegatose, Prati, ma rara specie.
- *cruciata* L. sotto Montefegatose in "una selva di castagni", e rara, unica localita trovata da me.
- *purpurea* L. nei Ceddori, Calda della grotta, solo di Biagio, e rara in Mondinajo.
- *utriculosa* L. Mupeta, Palodina, e Prato fiorito.
- *væva* L. l'ho trovata nel solo Fond.
- Geranium argenteum* L. Non ho mai trovato questa specie nell'appennino lucchese, ma bensì sull'alta Pania, e nell'alto Cimone di Garano.
- *pyrenaicum* L. Questa specie l'ho trovata in Pracchi, nella Mupeta,

- e grapp. lo Spedaletto al Carbonile
 Nouci lungo la via rotabile.
- Geranium sanguineum* L. Caggioppino al Prato fiorito
- *ylvaticum* L. Questa specie l'ho raccolta lungo il solo di Biagio, e mai altrove.
- Gerium macranthum* L. S. Pellegrino, Mondinajo, Tole a foggio, B. botenze, Prato all'acqua nei luoghi seccati.
- Globularia cordifolia* L. Nei monti Apuani Pania, e Gambusa.
- *incanescens* Sav. Nelle fessure dei macigni al Mondinajo.
- Graphalium dioicum* L. Pratina alpe di Coreghia regione del foggio, Prato fiorito, e Prato di Montefegatose.
- *rectum* Willd. Nel mammellone del

Rondinajo, è nel bapto in una selva
di castagni a Valdottavo.

Gyptophyla repens Best. Tambura.

Heracleum Panace L. Nella Musceta.

— *Pollinicum* Best. Comune nella Mu-
sceta

Hesperis matronalis L. Lungo il Belago
in Roccoloni apresso di Montefegatse.

Hieracium aureum Vill. Rondinajo, 3. Botenze
— *grandiflorum* all. Musceta, e Spedaletto.

— *jacquini* Vill. Nei luoghi calcarei allo
Spedaletto, è propriamente sul varo
Colla della Piastra. Questa specie
l'ho trovata ancora nella Pania, ed
alla Tambura. Bertoloni credo che
non citi queste due località: ed è pe-
rò molto rara, ovvero io non mi ci so-
no incontrato.

Hieracium galudifolium L. nei luoghi umi-
di della Musceta, raro nella Lamac-
cia, l'ho trovato ancora a S. Pellegrino.

— *flomentifolium* Best. l'ho trovato soltan-
to nei calcarei dello Spedaletto sopra
la via rotabile al Carbonile Tomei.

— *villosum* L. Prato fiorito, 4. Frati,
e Rondinajo.

Hypericum Cory L. Copioso al Brocinto delle
alpi Aquane. Trovato ancora ne lu-
ghi calcarei a Cociglia lungo la ~~strada~~
strada sulla Lima, e propriamente
presso il Monte Nero.

— *richesii* Best. a Misera Ciancia, Pra-
ta di Montefegatse, e Prato fiorito.

Holcus mollis L. S. Pellegrino, e Lucigra-
na in un luogo coltivato detto Piastringa.

Arctostaphylos petraea Curt. Sopra monte,
fegateje alla Bernacca; fra la Gue
a Lago, e la Foce del Brato fiorito.

In Botri al solco del Gibellino, ed
in alto lungo la Fegana a Chincarello.

Hyoisiamus niger L. Ho trovato questa spe-
cie a S. Pellegrino presso il Santua-
rio, e non altrove.

Iberis garxiana Bert. In Ponca.

Impatiens noli tangere L. S. Pellegrino.

Juncus alpinus Vill. Nei luoghi umidi al
Lago Baccio.

— *filiformis* L. Presso il Lago Baccio.

— *trifidus* L. Si trova comune al
Nondinajo, e sopra Barberzina al-
pe di Mesoglio.

Juniperus nana Willd. Scotticchiaglia,

Nondinajo, Gue Botenze etz.

Ranunculus acris L. In Braachi

— *lybaticus* L. In Campagnaja.

Lactuca perennis L. A Deggia di Dieci,
ma nella Petraja, e a Braachi, e mai
l'ho trovata più in alto.

Laserpitium latifolium L. Mufcata, e
Brato fiorito.

— *Silva* L. Cresce in copia al Bra-
to fiorito. Dicono i Contronepi che
questa pianta chiamata da essi Comu
nella messa sulle tavole che sopren-
gono il letto uccide i cimici se ve
ne sono. Fortunatamente non ho do-
vuto fare questa esperienza.

Lathyrus angulatus L. Nei campi d'Albereta.

— *Nissolia* Bert. Molto comune
fra i seminati di Albereta.

Lepidium campestre DC. Abetone.

Hibernum bulbiferum L. Muceta etc.

— *Plantagon* L. Muceta, e Prato Fiorito.

Linum alpinum L. Quattro Frati, 3.
Potenza, e Fondinajo.

Lithospermum graminifolium L. In Monte Pania
alpe Agnana. Nel Lucchese a Caviglia
presso il ponte Nero del torrente Lima
e nell' appennino nei calcarei di Botri.

Lonicera alpicana L. Alpe di Casaglio nei Freddoni.

Loranthus europaeus Sav. Non ho mai
trovato questa specie nel Lucchese,
ma bensì nel Modenese come a Gio
Lunato sulle querce, paese presso la
Pieve Pelajo, ed a Fanano.

Cotus viliginosa L. Questa specie non l'ho
mai trovata a Casaglio presso una sorgente

ta sulla strada modenese sotto il paese
ov'è una osteria detta la Cafetta,
e non l'ho mai trovata in altro luogo
dell' appennino.

Lucerna vedivica L. Lungo il torrente
Pelajo a Zoccoloni, ed a Montefalate,
dal basso a Partigliano, solo dal Frontone.

Luzula lutea DC. Luoghi erbosi ai Lagu-
cioli, e copiosissima nel Fondinajo.

Lycium Sylvaticum DC. Mascatello.

Lycopus exaltatus L. fil. Raccolta in
selva di Fanano ho trovato questa specie
nella sola località di Casaglio nel tor-
rente Fegana, e propriamente lungo
la Gosa del Molino del Sig. Maestro.

Medicago lupulina L. Bast. Lungo la via
Modenese in Pracchi.

Melanogaster nemorosus Nest. Nei Gradoni

Melica nutans L. Nei luoghi arborosi lungo il Salco di Biagio, ed a la sola località, ove ho trovato questa bella specie.

Meningithea trifoliata L. Comune nel Lago Baccio, alla Sporda, ove è bassa l'acqua.

Mercurialis perennis L. Nella Muceta, ed al Prato fiorito

Megacodon Amelanchier L. Ciaglia di Coreglia, e Fondinajo.

Miconia L. Nei luoghi calcarosi di Montefegatefe, di Palodina, Grotta de' mandorioni di Valico, e nei macchioni del Fondinajo.

Meum athamanticum DC. A Crestina alpe di Coreglia, al Prato fiorito, e copiosissimo nei prati di S. Pellegrino.

Meum caripolium Nest. Nella sera estiva, mita del Fondinajo una sola volta. Forse portatori dai prati dal Cimone, ove io non ho raccolto più volte? ... Forse lo spaziosai perchè ne raccolsi quanto ne vidi? ...

Meum rigidulum Nest. Grotte dei Mandorioni di Valico sopra Cardofo, Rifano, e Gambusa.

Monotropa Hypopitys L. Questa specie l'ho trovata sempre nella regione del Caffe, come sotto Montefegatefe, a Pescaglia in Sofo, a Vitiana a Debbia, ed a Tempanano di Saleottavo.

Montia fontana L. Alle sorgenti sopra Montefegatefe, e sopra Controre. L'ho sempre trovata nella regione del faggio.

Myosotis alpestris Willd. Comune nell'ap-
pennino al Prato Fiorito, alla Groffa
Musceta, e Cimone di Favano.

Myrrhis aromatica Bert. Nei campi sot-
to il Cimone di Favano alle Canovate.

— *aurea* Bert. Nei prati della Musceta
e Prato Fiorito.

— *hirpata* Spreng. Nella lamaccia.

— *magellanica* Bert. Ho trovato questa
specie nella sola Musceta.

Narcissus poeticus L. Comune al Prato
Fiorito, Prato di Pefaglia Palodina ed.

Nardus stricta L. In tutto l'appennino alto.

Pastinaca palustris DC. Nell'appennino bi-
stojese al Lago Nero sotto le 3. Potenze.

Orchis conopsea L. Montefegatefe, e Prato
Fiorito.

Orchis globosa L. Prato Fiorito.

— *maculata* L. a Montefegatefe.

— *odoratissima* Bert. In Botri. Specie rara.

— *gallensis* L. In Campagna per me
unica località.

— *Sambucina* L. Pratina, Musceta,
Prato Fiorito. La varietà nei me-
desimi luoghi.

— *reticulata* L. Misera Ciancia, Musce-
ta, e Prato Fiorito.

Ornithogalum pyrenaicum L. Palodina, Mu-
sceta, e Prato Fiorito.

Orobanchus verna L. Alla Groffa, in Bru-
gio, Montefegatefe.

Ranunculus officinalis L. Palodina, Pisanino,
Prato Fiorito.

Coradifia hiliastroid Bert. Ho trovato questa bella specie nella sola Muscata, ove è assai comune.

Pary quadrifolia L. La località unica, ove ho trovato questa specie è al Prato fiorito in un piccolo boschetto di avellani.

Parnassia zelandica L. Cresce una piccola sorgente a Rifugiani alpe di Tesejo regione del Faggio, e copiosa nella regione scoperta ai Lagacciuoli, etc.

Pedicularis tuberosa J. Bert. Copiosa al Prato fiorito, e nella Muscata.

Peristilus albidus Bert. al Prato fiorito, e ai Lagacciuoli. Specie piuttosto rara.

— *viridis* Bert. al Prato fiorito.

Phleum alpinum L. Prato fiorito, Meratello, Foce a Giovo.

— *Micheli* All. Copiosissimo in Pracchi.

Physalis Alkekengi L. A Gorfigliano nella Comune di Minacciano nelle selve sotto Vitiano, alla Torretta di Biancoli, etc.

Phyteuma Halicari Lam. Nella Muscata.

— *hemisphaerica* L. Copioso in Fondinajo.

— *Micheli* Willd. Prato fiorito.

— *orbiculare* L. Prato fiorito, e Fondinajo.

Pimpinella alpina Hoff. Spadaleto Fond.

— *Tragium* Pers. In alpe Tamburano.

Pringicula grandiflora Bert. Nei luoghi sponziosi della Muscata, e Lamaccia.

Prunella jucea L. In Prato. Propriamente quei pruni, che si essano sono stati tutti tagliati a carbone.

Plantago maritima L. Vissano, Foce a Giovo.

— *media* L. Bruglio, Muscata, Prato fiorito.

— *victoralis* Pers. Quattro Prati.

Plantago vitorialis Pers. Vin di Porteta, Bona
al faggio, e S. Stefano, ultima vegetazio-
ne dei faggi, e incomincia la regione
"Sopasta".

Poa alpina L. Mercatello, Foce a Giovo etc.
— *removalis* L. Nell'agrosarino comune,
Traddoni, Probaggino, Solco delle Ma-
tinella Sotto, e sopra la Spedatello.

Polygonum amara L. Nei prati del fond.

Polygonum alpinum Willd. In giardino raro,
comune a Pratera alpe di Coraglia.

— *Bistorta* L. Nei prati umidi della Ma-
secta, e nei prati, e margini dei seminati
a Pratera, ne' mai ho trovato altrove
questa specie.

Potentilla alpestris Best. In Praglia di Coraglia
regione Sopasta, giardino, si trova an-
cora il Prato fiorito, ma raro.

Potentilla aurea L. Praglia, e Pradivajo.

— *argentea* L. Foce a Casallajo, regione
"Cassa del Foggio". Non ho mai trovato
questa specie ad una maggiore altezza.

— *canescens* Best. Sopra i muri vecchi di
Montepagatelo.

— *rugosifolia* L. Cojiofissima al Prato fio-
rito.

Prenanthes purpurea L. Nella Mafeta.

Primula auricula L. Prato fiorito, ma
peraltro raro. Nei luoghi caldosi, ed
umidi in Botri, luoghi umidi alle
Grotte de Manerioni di Valico distante
sette miglia tra Casdoso e Palodina,
ed in maggior copia l'ho raccolta sul
Pradivajo alpe di Pratera.

— *elatior* Best. Questa rara specie l'ho

trovata in Bruglio di Montefalateze
sopra il Ponte a Gagli sul torrente
rente, ed è in ristretta località fra
il Rio Crucenola, ed il quinzio del
luogo Seminatoro. Questo piccolo luogo
Seminato detto Bruglio è a poca
distanza dal Ponte del Fontanone sul
la nuova Strada Madarese. Per
andarsi da Lucca si va in legno
fino al Fontanone suddetto.

Chi dice di averla avuta da me sotto
altra località dice una menzogna.

Primula saxatilis Zan. In tutto l'appar-
suno, ma in alto è più rada.

Prunus avium L. Ho trovato sempre que-
sta specie intorno alle case dei pastori
e mai nei luoghi lontani, e selvatici,
e per me non ha avuto spontanea di

nessun novità. Interrogati da me i
pastori mi hanno detto di averla sem-
pre coltivata.

Pulmonaria angustifolia L. al Mercatello, e
lungo il bosco di Biagio, ma non comune.

Pyrola rotundifolia L. Ho trovato questa
specie solamente in Palodina.

Ranunculus acrisifolius L. Comune a
Pretina, e più raro nel bosco di Biagio.

— *acris* L. Copiosissimo nei prati umidi
della Mugetta.

— *auricomis* L. Palodina, Brata, o Pradale
di Refugli, e Prato fiorito.

— *lanuginosus* L. In campo lungo, vicino
a Mezzanelli sopra il Ponte della Crucen-
ola regione del faggio, e Botri
nelle sponde, ma sono assai rari.

Gammarulus montanus Roll. Piana a
Mezzanelli alze di Montefagatafe, U-
giosissimo nei prati della Mufcata,
in Solo Maggiore presso Spedaletto
— *nemosus* Roll. Spedaletto, e Spede
casse di Botri.

Aphanus alpinus L. Nella Mufcata.

Aphidanthus Crista galli Cart. Nei campi
Sopra Montefagatafe, e Mufcata.
La varietà a Corbaggina, e alla
Borsa al Fallo regione Scopeto.

Pezomachus grossularia L. Ho trovato una sola
volta questa specie in una selva di
faggi appennino di Teseo (C. D. al Sassone).

Robertia taraxacoides H. In un luogo basso
prossimo alla Lamaccia, e nella pin-
alta Pania. alze Aquana.

Poda alpina L. Aquana, nella Mufcata, come
ne ai Lagaccinoli, Salto di Biagio, e Fond:
— collina Best. Pracchi, e Teseo.

— *porrifera* Smith. Comune nella Mufcata.

— *Sasophilus* Viv. Copiosa sopra l'Albereta
per la Foce a Lago, e di qui lungo la
strada per il Crato Givito.

— *Synsphyria* L. Questa rara specie
l'ho trovata soltanto in un sol luogo
del Pomorajo, e lungo il Solo di Biagio.

— *tomantop* Smith. Pracchi.

Quercus alpinus L. Nell'appennino Pistoje-
se alla Piana del Doggione sopra l'Abbe-
tore. Non ho mai trovata questa specie
nel Lucchese.

— *montanus* Daff. Lagaccinoli, e Fond:

Salix aurita Buccin. Nella Mufcata.

— *crataegifolia* Best. Alla Foce della Tava-
bura, ed al Vicinato delle alze Aquana.

Talix sagittoides Vill. Qta Specie che tro-
vata soltanto nei Freddoni appennino di
Cesepio.

— *grandifolia* Best. In Fondinajo.

— *nigrescens* Crisp. Ai Freddoni di Cesepio,
ed al Saffone. Non ho altre località.

Sambucus racemosa L. Freddoni, solo di Bia-
zio, e presso la Lanaccia.

Sanguisorba officinalis L. Cresce al Lago Nero
in luoghi umidi sotto la 3. Postaja.

Saxifraga aizoon Mart. Copiosa al Prato fiorito.
— *autumnalis* All. In luoghi umidi cal-
canei di Notri. Unica località trovata
fin qui da me.

— *alpestris* K. Spedalotto, Bian di Correto,
e Belvedere.

— *caesia* Best. al Monte Fiorito presso la
Baia alpe Ajmana.

Saxifraga granulata L. Nell'appennino
di Montefegatose in Catinarzi, e alla
Benuacca ove è copiosa. Trovata anche
al Prato fiorito, ma è rara.

— *ligulata* Coll. Nell'appennino di
Montefegatose alla Frasca, nei cal-
canei di Mandria, e in basso lungo
la via che da Lucca conduce ai Magli
nei calcanei sopra la Selvetta, e sopra
il Prato di Diceimo ove è copiosa.

— *moschata* Best. Copiosa nel Fondi-
najo, e nel Cimone di Ganano.

— *oppositifolia* K. In Fondinajo, e nella
miniera tra Fond., e Scorticchia.

— *stellata* K. In prossimità del Lago
Nero lungo le sorgenti d'acqua che vi
scorrono.

Scabiosa graminifolia L. Copiosa al Prociato,
e sul Monte Banca degli Amani.

— *oleifera* Benth. Banca, e Lambara.

Scandix australis Buccin. Non ho mai trovato que-
sta specie, e gli esemplari favoriti dal Pucc.

Hopp, ed esaminati ancora dal P. Pietro Bavi-

onio da S. Pietro L. I giovani botanici ha-
dono si occupano a ritrovar questa specie in
giuse e fra noi.

Scilla biflora L. Muceta, Spedaletto, e lungo
il colle fino quasi a Belvedere, Prato fi-
vito. Il luogo più basso ove io ho trovato
questa specie è Valdolice (oggi Camosciari
presso il torrente Celetra).

Silybum caricinum Vahl. Questa specie l'ho
trovata al di là di S. Pellegrino a pedana
Madone nei prati umidi. Dim questa
detto il Piano de' Lagotti.

Sikloanthus annuus L. Copiosissimo in Sol-
co Maggiore regione dal Faggio nei cam-
pi, in Albereta, Prato fiorito, Bifra-
giani alpe di Careglio regione del faggio nel
coltivato, etc.

Scorpusca hypanica B. Benth. Prato fiorito.

— *purpurea* L. Muceta, e S. Potenze.

Scrophularia Scyphi Hopp. Copiosa lungo il
Sole di Prato, Spedaletto presso la Chia-
rina, Muceta, e Sole Maggiore.

Sedum aene L. Nel prato dello Spedaletto
presso l'Orteria.

— *atratum* L. Nella sommità della Ba-
nia, e copioso in una selva di faggi sotto
i Lagaccinoli, e in Mondinojo.

— *monvegalese* Desf. Nel Mondinojo.

— *rubens* L. allo Spedaletto, ma raro, ma

l'ho trovato più in alto. Comunque in basso.
Helinum ulcatus Ten. Nella Sporda orientale
del Solco di Biagio.

Sanguisorbum artemisoides L. Questa specie
l'ho trovata nel solo giardino, ove è
copiosissimo fra i Saggi.

— *montanum* L. alle Tre Bottegge, e So-
gra i. Lagaccinoli, ma non tanto comune;
l'ho trovato, ancora sul Monte Cimone.

— *tactum* L. Copioso nei luoghi Saggi
di Prato fiorito. Non l'ho mai trova-
to in luoghi più alti.

Sanicula Lonicum L. Nel Prato fiorito af-
fai comune. Si trova ancora a' Quattro
Grati presso il giardino.

— *laciniata* Bertol. Spedaletto, e Marcatello.

— *virgata* L. Montefegatose, Spedaletto, Pin

di Borsetta, e Gian di Fegane presso Spedaletto.

Scorsetula strictoria L. Comune al Prato fiorito,
e comunque a Misera Ciancia, e Prato
di Montefegatose.

Silene acaulis L. Mai ho trovato questa specie
nei monti Lucchesi, ma bensì in gran
 copia nell'effresmità del Monte Cimone.

— *laevigata* Bertol. al Prociotto, Pania, Tam-
bura. Ho trovato poi di una vegetazione
affai più bella questa specie sulle Grotte
de' Mandriani di Galico fra Casole, e Palo-
dina Leone da' monti Apuani.

— *β Bertol.* Questa bella varietà l'
ho trovata solamente nella Gambra
dal lato che guarda Massa, ma è rara.

— *quadrifida* L. alla sorgenti che scendono
nella ^{sotto la foce a Giovo a' Intrane,} Lamaccia, al Lago Nero, ed in
Compagnaja. Sono queste le sole località
nelle quali ho trovato questa specie.

Silene acaulis L. Nel monte Forst. comune.

— *Saxifraga* L. In Fondinajo, e a Melvedasaja.

— *Vallegia* Bertol. Fra gl' erboj della Pania dal lato, e sopra il Monte-forato.

Sijmbria pinnatifida DC. Lungo il torrente Pelago in Botri, a Montefagataja, e nell' Appennino Modenese lungo la via che da Fiumalbo conduce al Cimone.

Selconella alpina L. Ho trovato questa specie al Monte Cimone, ed alla Pania sopra Spvana.

Solidago pygmaea Bert. Sopra all' acqua, Fondinajo, e Tre Potenze ove è comunissima.

Sorbus aucuparia L. Nel solco di Biagio, S. Fellegrino, e nell' Appennino Modenese alla Tagliole, e a Fiumalbo.

Spartium radiatum Bert. In alto sopra la Foce a Gobbio, solco di Biagio, S. Fati, e Fondinajo.

Sprengelia glabra Willd. In tutti i luoghi alti dell' Appennino.

Scirpus ulmaria B. Bert. a S. Pellegrino, e nell' appennino Modenese a Doccia sotto il Monte Cimone ove è copiosa.

Stachys alpina L. Alla Mafeta, ed in Marchi.

— *labiosa* Bert. Fondinajo, e S. Fati.

Stellaria aquatica Ten. Foce a Giovo, ed in tutti i luoghi uliginosi che dalla riviera Giovo si trovano per andare al Lago Piatto vicino le 3. Potenze.

— *graminea* L. Nei prati della Mafeta, e al Piano del Lago sopra Montefagataja.

— *Holoptea* L. Lungo il solco di Biagio, e al Piano di Correta. Sono queste le sole località ove io ho trovato questa specie.

— *remota* L. Comune in tutto l' Appennino.

— *Saxifraga* sp. In Fondinajo, Melvedasa.

Oressa la Foce a Lugo, e vicino il Prato fi-
vito, ma piuttosto rara.

Hernbergia lutea Des. Ho trovata questa specie
in una erica a Tedegolo, e fioriva d'ore.
Specie piuttosto rara. Non l'ho mai trovata ad
una altezza maggiore.

Hieronymus amphixifolius Poir. Nel Lucchese
ho trovata questa rara specie soltanto nel-
la Lamaccia in luogo umido. L'ho tro-
vata copiosa nei prati secchi del Brianco de
Lagetti agerone Modanese distante circa
quattro miglia da S. Pellegrino.

Spergularia parviflora L. S. Pellegrino.

Taxus baccata L. Nella vallata sopra di Botri.

Thalictrum Botrys L. In luoghi sassosi della
Caldà di Praduscello a Montefegatefe.

Thalictrum montanum L. In Campagnaja, e Casina
alpe Aquana.

Thalictrum aquilegifolium L. Nel aggerino a
Montefegatefe, e sopra l'Albereta.

Thalictrum minus L. Nella Majcata. Comunità
al Prato fivito: sono al solco di Biagio.

Thalictrum alpinum L. S. Fati, e Prato fivito.

Thalictrum arvense L. Nella ^{campi coltivati in Albereta}
~~Montefegatefe~~ ~~Montefegatefe~~
Thalictrum montanum B. Mart. Copioso a Prastina al-
pe di Coreghia, ed a S. Pellegrino.

Thymus acinos L. In Pracchi comune.

Thymus L. Spedalotto, e Campagnaja, e
Foce Cavallajo.

Thymus grandiflorus Scop. Comune lungo il Solco di
Biagio, e Pian di Prastina.

Thymus majus L. Nella Prata di Montefe-
gatefe

Thymus porrifolium L. In Mandria alpe di Mon-

tefegatepe, a Coreglia in Guerceto. Nei
luoghi bassi fra Diccino ed Orago a Mojano,
e a Veduggio a Castello.

ragopogon pratensis L. Prato fiorito, e Muscata.

Triplium agrarium Bast. Nei prati della Muscata.

— *alpinum* L. Solo trovato solamente
in Giardino in circospettissima località.
Cospicuo solo trovato nei prati a Doc-
cia sotto il Monte Cimone.

— *caespitosum* Bast. Cospicuo nel Giardino.

— *incarnatum* L. Comunissimo ai margini
dei campi sopra Montefegatepe, e me-
no comune al Prato fiorito.

— *medium* L. Su Bracchi, Braggio, al Pon-
te della Crucivola, e sopra Montefegatepe.

— *minus* Bast. Comune nei prati della
Muscata.

— *montanum* Bast. Cospicuo a Mojano Cimone.

cia, Campo lungo ai margini dei campi,
Prato a Mezzanelli, e Prato di Montefegatepe.

Trifolium repens L. Cospicuo al Prato fiorito.

Triticum caninum Stud. Nei Prati al-
pe di Casaglio.

Trochilanthus nodiflorus DC. Nell'appendice
lungo il Sole di Biagio.

Trollius europaeus L. Nei prati umidi della
Muscata. Io non conosco altre località.

Tulipa Celfiana DC. Nell'appendice lun-
ghese ai Diavetto del Giardino, e nei
prati Aquani nel gran prato del Sifamino,
ove è cospicuo.

Tussilago alba L. Su Campo Lungo, e nella
Muscata lungo i rigagnoli.

— *alpina* L. Bosco all'acqua, Giardino,

Lagacciuoli, Tre Potenze etc. L'ho trovata sempre fra i Jacciniid.

Jacciniid myrtillus L. Nei luoghi alti, e bassi di tutto l'Appennino.

— *uliginosum* L. Nei luoghi più eminenti dell'Appennino. Gondrigno, Lagacciuoli, Tre Potenze etc.

Galericiana montana L. L'ho trovata nel Pignino soltanto.

— *officinalis* L. al Prato fiorito, ove è piuttosto rara. Cresce nei campi verdi di Pretina alpe di Coraglia.

— *saxatilis* L. Nel monte Pania alpe Armana.

— *triplex* L. Fra i macigni del Medaello, e fra a Giovo assai comune.

Vallisneria spiralis L. Nel Lagoaccio. Questa specie non l'ho mai trovata ne in fiore, ne in frutto.

Veratrum Lobelianum Bernh. Nella Musceta comune, Prato fiorito. Trova si anche ai Lagacciuoli, e nei dintorni. Non l'ho trovato mai nell'Appennino di Fereglio.

— *nigrum* L. Questa specie l'ho trovata soltanto al Prato fiorito, ed è meno comune del *V. Lobelianum*.

Verbascum Lychnitidis B. Bast. lungo il torrente Belago in Botri.

— *montanum* Schrad. Comune in tutto l'Appennino.

— *nigrum* B. Bast. S. Pellegrino.

Nel primo fascicolo del suo Pro-
dromo pubblicato, pochi sbagli si sono
da rilevare, e queste piccole sarebbe-
ro le seguenti.

Arumore nasipiflora L. Galpa la lo-
calità di Pretina col mio nome

Lejiconia utriculata DC. Galpa la
località di Botu col mio nome.

Draba aizoides L. Giustizima e la
osservazione da lei. Stagnato sul
suo Prodromo.

Hollus europaeus L. Brato fissito succ. 295.

Le faccio un' altra osservazione sul
Grölling europaeus L. Perché essendo una
località prossima ai bagni, viene frequen-
tata spesso dai forestieri, fra i quali vi
possono essere dei Botanici, come ancor' io
ce ne ho incontrati nelle frequenti
esplorazioni che ho fatto in quel prato.

Io non ho mai trovato in questo luogo
il Grölling, e la località del Puccinelli
non bisogna valutarla gran cosa. Questa
l' autorità del P. Calandrucci. Io gli scrissi
che per piacere mi' indicasse la località, se vol-
le adiacente, o nel Prato, ma disgraziatamen-
te non ho avuto il bene di aver la risposta.
Se questa pianta in vece di raccogliersela egli
l' ha avuta dal Puccinelli, allora sostiene
falsa la località, bene inteso, di Prato fiorito.
2' una specie che non sfugge a chi la cerca.

Nella Lamaccia, ove il Puccinelli non è
mai stato, non vi è sicuramente sebbene in via
l' acqua, mentre il prato fiorito è secco. Su
Sylis alpinus parimente come scrive il Pucc.
io non ce l' ho mai trovato. So di aver da-
to più volte al Gucc. questa specie, e di a-
verla portata viva al Giardino, messa al
di sopra del Laghetto, ove visse alcuni an-
ni, e poi lasciò, ma colta nella Muceta.

L' Actaea viricata L. parimente io non
l' ho mai trovata al Prato fiorito, ma
sono specie, che io non posso infallibilmente
asserire non essere in quelle località perché
non hanno il mio nome.

Il Diplotomo del Pucc. era un genovese
che non sapeva leggere; quando esportava il
suo legno era di trovare erbe medicinali
per venderle ai Farmacisti, e trasportare
quella di chi lo mandava: ecco anche una
ragione per tante false località.